



Trên bệnh nhân tăng cholesterol máu có nguy cơ trung bình cao bị BMV và không đạt mục tiêu LDL-C với statin đơn trị^a

^aBệnh nhân không đạt mục tiêu theo NCEP ATP III <100mg/dL với atorvastatin 20 mg. Tiêu chuẩn chọn bệnh là bệnh nhân có nguy cơ trung bình cao bị BMV và LDL-C ≥ 100 đến ≤ 160 mg/dL. Kết cục chính là phần trăm thay đổi LDL-C trung bình sau 6 tuần điều trị so với ban đầu. Kết cục phụ bao gồm phần trăm bệnh nhân đạt LDL-C ≤ 100 mg/dL sau 6 tuần điều trị.¹

Trên nền điều trị với atorvastatin, thêm EZETIMIBE giúp giảm LDL-C hiệu quả hơn

Tài liệu tham khảo: 1. Conard SE, Bays HE, Leiter LA, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (20 mg) versus uptitration of atorvastatin (to 40 mg) in hypercholesterolemic patients at moderately high risk for coronary heart disease. Am J Cardiol. 2008;102(11):1489–1494.



DÙNG TRONG TĂNG CHOLESTEROL MÁU, CHỨA ĐẠT MỤC TIÊU LDL-C VỚI STATIN ĐƠN TRỊ

EZETROL[™]
(ezetimibe)

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của cục QLD-BYT: xxxx/xx/QLD-TT

Ngày cấp:

Thông tin kê toa sản phẩm xin vui lòng xem trang 2

Code: CARD-1033397-0003