



Tài liệu Thông tin cho cán bộ Y tế

LODIMAX® Plus Atenolol



**Lựa chọn cho điều trị tăng huyết áp
không đáp ứng với đơn trị liệu**

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế XXXX/XX/QLD-TT,
Ngày ... tháng ... năm; ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu. Thông tin chi tiết của sản phẩm xem ở trang 02.

①

Tài liệu Thông tin cho cán bộ Y tế

LODIMAX® Plus Atenolol

THÀNH PHẦN:

Atenolol 50mg
Amlodipin 5mg

CHỈ ĐỊNH:

Lodimax® plus Atenolol được chỉ định trong điều trị:

- Tăng huyết áp mà không kiểm soát được bằng đơn trị liệu.
- Con đau thắt ngực do suy mạch vành.
- Bệnh lý kết hợp tăng huyết áp và suy mạch vành.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Tăng huyết áp trung bình đến nặng, suy mạch vành hoặc bệnh kết hợp tăng huyết áp và suy mạch vành: Uống 1-2 viên, một lần trong ngày.
- Người lớn tuổi: Nên uống liều khởi đầu là 1/2 viên, một lần trong ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:

Có thất phế quản: Cần thận trọng sử dụng thuốc này ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn. Thương tổn thận: Tuy nhiên thận trọng là cần thiết nhân suy thận. Tuy nhiên thận trọng là cần thiết nhân độ thanh thải creatinin < 30 ml/phút, do khả năng giảm bài xuất của atenolol. Thương tổn gan: Thận trọng là cần thiết khi sử dụng cho bệnh nhân có thương tổn gan nặng vì kéo dài thời gian bán hủy của Amlodipin.

Ngừng thuốc: Do bệnh động mạch vành có thể tồn tại mà không có triệu chứng, bệnh nhân cần

được cảnh báo không nên ngừng thuốc đột ngột. Bất kỳ sự ngừng uống thuốc phải tuân thủ sự giảm liều từ từ và có sự giám sát của bác sĩ.

- Thận trọng sử dụng thuốc này ở người già.

Sử dụng ở trẻ em: Chưa có những kinh nghiệm sẵn có sử dụng Amlodipin ở trẻ em.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Đau đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt, đánh trống ngực, phù ngoại biên, mệt mỏi, buồn ngủ, đau bụng. Ít gặp: Chuột rút, khó thở, khó tiêu, ngứa và phát ban da, khó mắt. Hiếm gặp: Vàng da.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Lodimax® plus atenolol có thể tương tác với digoxin, quinidin, các thuốc kháng viêm không steroid.
- Thuốc uống điều trị tiểu đường và insulin: Thuốc chẹn beta có thể làm giảm độ nhạy cảm của mô đối với insulin và ức chế bài tiết của insulin do đáp ứng với thuốc uống điều trị tiểu đường. Atenolol ít có tác dụng này.

TRÌNH BÀY:

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

Nhà máy: Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai - ĐT: (061) 3992 999 - Fax: (061) 3853 088
VP. Hồ Chí Minh: P.1006, Lầu 10, Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM - ĐT: 08-38205 337 - Fax: 08-38205 336
VP Hà Nội: Tầng 4, King Building, số 7 Phố Chuá Bực, Q. Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (04) 37 342 774 - Fax: (04) 37 342 773

②