

BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT - BVP

khí lực dồi dào

máu huyết lưu thông!

ĐIỀU TRỊ:

- ✓ Rối loạn giấc ngủ, đau đầu
- ✓ Suy giảm trí nhớ
- ✓ Tê mỏi tay chân
- ✓ Hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa 240 mg cao khô toàn phần chiết được từ 1590 mg các dược liệu khô sau:

Hoàng kỳ	(Radix Astragal membranacei)	760 mg
Đào nhân	(Semen Pruni)	70 mg
Hồng hoa	(Flos Carthami tinctorii)	70 mg
Địa long	(Pheretima aspergillum)	160 mg
Nhân sâm	(Radix Panax ginseng)	50 mg
Xuyên khung	(Rhizoma Ligustici wallichii)	60 mg
Dương quy	(Radix Angelicae sinensis)	140 mg
Bạch thược	(Radix Paeoniae lactiflorae)	140 mg
Các tá dược: Natri starch glycolat, Tinh bột ngô, Lactose, Silic dioxid dạng keo khan, Magnesi stearat, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose, Opadry trong suốt, Ethanol 96%, Nước tinh khiết vừa đủ.		

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- Công năng: Bổ khí, hoạt huyết, giúp cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.
- Chủ trị : Thuốc được dùng trong các trường hợp:
 - + Rối loạn tuần hoàn ở não, và ngoại biên như mặt mới, đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, rối loạn giấc ngủ, tê mỏi tay chân, đau mỏi vai gáy.

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
 Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM
 NHÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 246 Cộng Quỳnh, Quận 1, TP.HCM
 Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: .../.../QLD-TT, ngày... tháng... năm...

Điện thoại: **1800 8086**

Shawana 28/04/15

+ Hỗ trợ phòng ngừa và hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch với các triệu chứng: đau thắt ngực, cơ hăm, lưng khi vận động và stress
 + Hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não và các di chứng tai biến như: liệt nhẹ, tay chân khó cử động, nói khó hoặc không nói được, miệng méo, lưỡi lệch.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
 - Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên.
 - Uống với nước ấm, sau các bữa ăn. Dùng liên tục trong 3 tháng hoặc hơn.
 - Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, phụ nữ có thai.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
 Dùng thận trọng cho người đang chảy máu, rối loạn đông huyết hoặc đang dùng các thuốc chống đông máu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẒ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.