

DI-ANSEL[®] EXTRA

Paracetamol 500 mg
Codeine phosphate 8 mg
Caffeine 30 mg



ROUSSEL VIETNAM

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM** - 702 Trường Sa, P.14, Q.3, Tp HCM - ĐT: (08) 39 31 55 18 - Fax: (08) 39 31 55 20
Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của QQLD-BYT: _____ Ngày in tài liệu: _____

www.rousselvietnam.com.vn

Tài liệu dành cho công chúng

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Paracetamol 500 mg, Codein phosphat 8 mg, Caffein khan 30 mg.
DẠNG TRÌNH BÀY: Viên nang. Hộp 2 vỉ x 10 viên. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các cơn đau mức độ trung bình không đáp ứng với aspirin hoặc paracetamol đơn thuần, có hoặc không kèm nóng sốt: đau nhức cơ bắp, đau xương, đau khớp, đau lưng, đau răng, đau bụng kinh, đau thần kinh, đau do cảm cúm, viêm họng hay mũi xoang, đau do chấn thương, bong gân, đau sau phẫu thuật (từ phẫu thuật ở đầu, bụng)... **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Bệnh nhân đã từng bị thiếu máu, bệnh nhân suy tim, phổi, suy thận, suy gan và bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (do có paracetamol). Suy hô hấp, hen phế quản, trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cắt amidan và hoặc thủ thuật nạo V.A (do có codein). Phụ nữ có thai và cho con bú. **LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:** Thuốc uống, đánh cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1 viên, mỗi ngày 2-4 lần. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 4-6 giờ không uống quá 8 viên/ngày. Không dùng quá 10 ngày đối với người lớn và 5 ngày đối với trẻ em. Trường hợp suy thận nặng, khoảng cách giữa 2 lần uống thuốc phải dài hơn 8 giờ. **THẬN TRỌNG:** Không nên dùng rượu trong khi điều trị với thuốc này. Do nguy cơ suy hô hấp, chỉ sử dụng các chất chứa codein để giảm đau cấp tính ở mức độ trung bình cho trẻ em trên 12 tuổi khi các thuốc giảm đau khác như paracetamol và ibuprofen không có hiệu quả. Codein chỉ nên được sử dụng ở liều thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất. Không khuyến cáo sử dụng codein cho trẻ em có các quá và triệu chứng liên quan đến hô hấp (Ví dụ: khó thở hoặc thở khó khê khi ngủ...). Thận trọng khi sử dụng codein cho trẻ em dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc cho đối tượng này còn hạn chế). Hãy thông báo cho thầy thuốc những trường hợp sau: Các bệnh gan, thận, Các bệnh đường hô hấp (bao gồm bệnh hen), Có sung huyết phế quản (ho có đờm), Phẫu thuật túi mật. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể có một số tác dụng phụ ở một số người. Liên quan đến codein: buồn ngủ, chóng mặt, khó thở, phản ứng quá mẫn cảm; táo bón, tiêu chảy, nôn; đau bụng cấp tính, đặc biệt ở người đã qua phẫu thuật túi mật. Liên quan đến paracetamol: Hiếm gặp: phát ban, đỏ da, phản ứng dị ứng. Liên quan đến caffeine: mất ngủ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. **BẢO QUẢN:** Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. **HẠN DÙNG:** 36 tháng từ ngày sản xuất. **SDK: VD-18092-12 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG.**

Sản xuất tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM

Số 01, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

DI-ANSEL[®] EXTRA hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

