


Repamax[®] EXTRA

Paracetamol 500 mg
Cafein 65 mg



Nhanh chóng làm dịu **CƠN ĐAU**

Nylceger
21/10/2013



THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM:

THÀNH PHẦN: Paracetamol 500 mg, Cafein 65 mg. **TRÌNH BÀY:** Hộp 10 vi x 10 viên bao phim.

CHỈ ĐỊNH: Repamax[®] EXTRA làm giảm các triệu chứng sốt, đau nhức như nhức đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng, đau do hành kinh, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp. **LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:** Người lớn: Dùng 1-2 viên/lần, 3-4 lần/ngày, không quá 8 viên/ngày. Trẻ em từ 7-12 tuổi: 1 viên/lần, không quá 4 viên/ngày. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Bệnh nhân nhạy cảm với paracetamol. Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase. Trường hợp viêm gan tiến triển nặng, người suy thận nặng, suy mạch vành, nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu. **THẬN TRỌNG:** Bệnh nhân có thiếu máu từ trước. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát sẩn ngứa và mề đay xảy ra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra với việc sử dụng những dẫn chất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol, hiếm gặp mất bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol. Bệnh nhân suy gan, thận phải giảm liều tùy theo mức độ bệnh gan, thận. **PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:** Chỉ dùng khi thật cần thiết. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Trên da: hiếm khi phát ban hoặc ngứa, thường là ban đỏ hoặc mề đay nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn niêm mạc. Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.

BẢO QUẢN: nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng. **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **SDK:** VD-9785-09

ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Sản xuất tại Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM** - Số 01, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty **ROUSSEL VIỆT NAM** - 702 Trường Sa, P.14, Q.3, Tp HCM - ĐT: (08) 39 31 55 18 - Fax: (08) 39 31 55 20

ROUSSEL VIETNAM



Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng kí quảng cáo thuốc của CQLĐ-BYT:
Ngày in tài liệu: