

Repamax[®] EXTRA

Paracetamol 500 mg
Cafein 65 mg



Manh chóng làm dịu

CON ĐAU

Tài liệu dành cho công chúng

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM:

THÀNH PHẦN: Paracetamol 500 mg, Cafein 65 mg.

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.


CHỈ ĐỊNH: Repamax[®] EXTRA làm giảm các triệu chứng sốt, đau nhức như nhức đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau sau khi tiêm ngừa hay nhờ răng, đau do hành kinh, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp. **LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:** Người lớn: Dùng 1-2 viên/lần, 3-4 lần/ngày, không quá 8 viên/ngày. Trẻ em từ 7-12 tuổi: 1 viên/lần, không quá 4 viên/ngày.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân nhạy cảm với paracetamol. Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase. Trường hợp viêm gan tiến triển nặng, người suy thận nặng, suy mạch vành, nhồi máu cơ tim, nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu. **THẬN TRỌNG:** Bệnh nhân có thiếu máu từ trước. Đới khi có những phản ứng da gồm ban dát sẩn ngứa và mề đay xảy ra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu đa xảy ra với việc sử dụng những dẫn chất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đa xảy ra khi dùng paracetamol, hiếm gặp mề đay bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol. Bệnh nhân suy gan, thận phải giảm liều tùy theo mức độ bệnh gan, thận. **PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:** Chỉ dùng khi thật cần thiết. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Trên da: hiếm khi phát ban hoặc ngứa, thường là ban đỏ hoặc mề đay nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt thuốc và thường tồn miễn mặc. Trồng một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.

BẢO QUẢN: nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **SDK:** VD-9785-09

ROUSSEL VIETNAM



ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY TRẒ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số 01, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty ROUSSEL VIỆT NAM

702 Trường Sa, P.14, Q.3, TP HCM - ĐT: (08) 39 31 55 18 - Fax: (08) 39 31 55 20

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng kí quảng cáo thuốc của QGLD-BYT:

Ngày in tài liệu:

www.rousselvietnam.com.vn

