


Tóm tắt hướng dẫn điều trị


Bảng 1. Hướng dẫn điều trị sau khi phơi nhiễm

Phân loại	Loại tiếp xúc với con vật nghi ngờ bị dại hoặc đã xác định là bị bệnh dại	Điều trị nên áp dụng
I	Tiếp xúc hoặc cho súc vật ăn. Súc vật liếm trên da lành.	Không điều trị nếu có bệnh sử đáng tin cậy
II	Găm vùng da trần, bị xước nhẹ hoặc xước không bị chảy máu, liếm trên vùng da bị trầy xước.	Tiêm vắc xin ngay lập tức. Ngưng điều trị nếu súc vật vẫn khỏe mạnh trong thời gian 10 ngày hoặc bị giết và có âm tính với virus dại khi xét nghiệm bằng phương pháp thích hợp
III	Một hoặc nhiều vết cắn qua da hoặc vết xước bị nhiễm nước dãi (liếm)	Sử dụng Globulins miễn dịch và tiêm vắc xin ngay lập tức. Ngưng điều trị nếu như súc vật vẫn khỏe mạnh khi được quan sát trong 10 ngày hoặc nếu súc vật bị giết và âm tính với virus dại khi xét nghiệm bằng kỹ thuật thích hợp.

Phác đồ tiêm bắp cho dự phòng sau phơi nhiễm ở người chưa tiêm dự phòng



Phác đồ tiêm trong da cho dự phòng sau phơi nhiễm ở người chưa tiêm dự phòng



SDK: QLVX - 0230 - 09

World Wide Medical

AMV GROUP



AbhayrabTM



Abhayrab[®]

Thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem trang 3,4

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế XXXXXX/QLD-TT, ngày tháng năm

Ngày, tháng, năm in tài liệu:



AMV GROUP

Điện thoại liên hệ: +84 988 77 82 96 / Email: info@amv.vn / Website: www.amv.vn

AMV GROUP