

GLUCOFLEX® 500

VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

- Glucosamine sulfate 500 mg tương đương với 392,5mg glucosamine (dưới dạng Glucosamine sulfate potassium chloride).
- Tá dược: Microcrystalline cellulose, Mannitol, Povidone, Alginic acid, Stearic acid, Magnesium stearate, Croscarmellose sodium, Opadry II white, Sunset yellow lake, Nước tinh khiết vđ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250mg đến 1500mg glucosamine / ngày (các dạng muối của glucosamine được quy đổi tương ứng với glucosamine), chia làm 3 lần.

Với **GLUCOFLEX® 500** có thể uống 3 viên chia làm 3 lần trong ngày.

Có thể dùng đơn độc glucosamine sulfate hoặc phối hợp với các thuốc khác như chondroitine 1200mg / ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo từng cá thể, ít nhất dùng trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TÁC DỤNG PHỤ:

Thuốc có chứa sulfur nên có thể gây rối loạn tiêu hóa nhẹ và thoáng qua.

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG BẤT LỢI GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT & CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

Khi điều trị các bệnh mãn tính, cần xem xét các khả năng sau:

- Khi áp dụng phác đồ điều trị lâu dài cần tiến hành các xét nghiệm lâm sàng định kỳ: thử nước tiểu, xét nghiệm máu, xét nghiệm chức năng gan...
- Nên xem xét các phương pháp điều trị khác với việc

dùng thuốc.

Khi điều trị các bệnh cấp tính, cần xem xét các khả năng sau:

- Cần theo dõi bệnh nhân trong trường hợp viêm cấp tính.
- Tránh dùng 1 loại thuốc trong một thời gian dài.
- Không dùng chung với các thuốc kháng viêm giảm đau khác.

Lưu ý đến các tác dụng phụ khi dùng thuốc cho trẻ em và người lớn tuổi, nên dùng với liều thấp nhất có tác dụng trị liệu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên kết hợp đồng thời thuốc này với các thuốc kháng viêm, giảm đau.

QUÁ LIỀU:

Liều cao của Glucosamine có thể gây bất thường đường tiêu hóa như phân mềm, tiêu chảy, buồn nôn. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ là cần thiết.

BẢO QUẢN:

Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY:

Vỉ 10 viên nén dài bao phim, hộp 3 vỉ và hộp 10 vỉ.

TIÊU CHUẨN:

Dược Điển Việt Nam IV.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc

SẢN XUẤT BỞI:

CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

ĐT: 0613-566205 - Fax: 0613-566203

SĐK/VISA NO: VD-15713-11

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty sanofi-aventis Việt Nam, 10 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84 8) 3829 8526 - Fax: (84 8) 3914 4801.

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84 4) 3537 1835 - Fax: (84 4) 3537 1841

sanofi aventis

Because health matters