

Repamax 500

Paracetamol 500 mg

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị các triệu chứng sốt, đau nhức như nhức đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng, đau do hành kinh, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp.
- Thay thế salicylat để giảm đau nhẹ, hạ sốt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- *Người lớn*: 1-2 viên/lần x 3-4 lần/ngày. Khoảng cách giữa 2 lần uống tối thiểu là 4 giờ, không quá 8 viên/ngày. Khoảng cách này là 4-8 giờ tùy theo mức độ suy thận.
- *Trẻ em từ 7-12 tuổi*: 1 viên/lần, không quá 4 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân quá mẫn với paracetamol.
- Bệnh nhân nhiều lần thiếu máu.
- Người bệnh thiếu hụt G6PD
- Viêm gan tiến triển nặng, suy thận nặng.

THẬN TRỌNG

- Bệnh nhân có thiếu máu từ trước. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát, sẩn ngứa và mề đay xảy ra.
- Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra khi sử dụng những dẫn chất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính, ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol. Hiếm gặp mất bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol.
- Tránh hoặc không nên uống rượu.
- Không dùng chung với các thuốc khác có chứa paracetamol.
- Giảm liều tùy theo mức độ bệnh gan, thận.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- *Phụ nữ có thai*: chỉ dùng khi thật cần thiết.
- *Phụ nữ cho con bú*: không thấy tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Uống *rượu* quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ gây độc cho gan.
- Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của *coumarin* và dẫn chất *indandion*.
- Thuốc chống co giật (*phenytoin*, *barbiturat*, *carbamazepin*) gây cảm ứng enzym ở *microsome* của tế bào gan, có thể làm tăng tính độc hại gan của paracetamol do tăng chuyển hóa thuốc thành những chất độc hại với gan. Dùng đồng thời *isoniazid* với paracetamol cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính với gan.
- Giảm hấp thu *muối sắt*, *ester ampicilin*.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Repamax 500 được dung nạp tốt, các tác dụng không mong muốn thường nhẹ và có thể hồi phục sau khi ngưng dùng thuốc.
- Một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.
- Trên da: hiếm khi phát ban hoặc ngứa.

BẢO QUẢN: nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

SĐK: VD-9784-09



Sản xuất tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM - Số 01, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty ROUSSEL VIỆT NAM - 702 Trường Sa, P.14, Q.3, Tp HCM

ĐT: (08) 39 31 55 18 - Fax: (08) 39 31 55 20