

Репамax 500

GIẢM ĐAU

CHÀ SỐT



ROUSSEL VIETNAM



CHỈ ĐỊNH

- Thay thế salicylat để giảm đau nhẹ, hạ sốt.

- **Người lớn:** 1-2 viên/lần x 3-4 lần/ngày. Khoảng cách giữa 2 lần uống tối thiểu là 4 giờ, không quá 8 viên/ngày. Khoảng cách này là 4-8 giờ tùy theo mức độ suy thận.
- **Trẻ em từ 7-12 tuổi:** 1 viên/lần, không quá 4 viên/ngày.

- Bệnh nhân quá mẫn với paracetamol.

- Bệnh nhân nhiều lần thiếu máu.
- Người bệnh thiếu hụt G6PD
- Viêm gan tiến triển nặng, suy thận nặng.

- Phụ nữ có thai: chỉ dùng khi thật cần thiết.

- Phụ nữ cho con bú: không thấy tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

- Bệnh nhân có thiếu máu từ trước. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát, sản

- Giảm đau và hạ sốt.
- Giảm tiêu chảy, giảm bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra khi sử dụng những dẫn chất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính, ban xuất huyết, giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol. Hiếm gặp mất bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol.
- Tránh hoặc không nên uống rượu.
- Không dùng chung với các thuốc khác có chứa paracetamol.
- Giảm liều tùy theo mức độ bệnh gan, thận.

- Repamax 500 được dung nạp tốt, các tác dụng không mong muốn thường nhẹ và có

- thể hồi phục sau khi ngưng dùng thuốc.
- Một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.

- Trên da: hiếm khi phát ban hoặc ngứa.

BẢO QUẢN: nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. **SDK:** VD-9784-09

ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Sản xuất tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM

Số 01, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty ROUSSEL VIỆT NAM

702 Trường Sa, P.14, Q.3, TP HCM - ĐT: (08) 39 31 55 18 - Fax: (08) 39 31 55 20

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền của CQI D-BYT:

Ngày in tài liệu:

www.rousselvietnam.com.vn

