

Fugacar®

1 viên nhai, diệt các loại giun
giun đũa, giun kim, giun tóc, giun móc

JANSSEN-CILAG
VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI

G
bản
cần

Nguyễn
8/10/18



VỊ SOCOLA



KHÔNG VỊ



VỊ TRÁI CÂY

Janssen Cilag Ltd.

Thành phần: Mỗi viên nén chứa 500mg Mebendazole.
Chỉ định: Nhiễm một hay nhiều loại giun đường ruột: giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim.
Liều dùng và cách dùng: Uống 1 viên duy nhất, có thể nhai viên thuốc trước khi nuốt. Không cần áp dụng ăn kiêng hay dùng thuốc xổ. Ở vùng có dịch tả nhiễm giun đường ruột nặng, tẩy giun đường ruột định kỳ 3-4 lần mỗi năm bằng Fugacar sẽ giảm đáng kể dịch bệnh.
Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với thành phần của thuốc. Không nên dùng Fugacar 500mg cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai 3 tháng đầu và bệnh nhân suy gan.
Thận trọng: Trong quá trình lưu hành thuốc, các cơn co giật ở trẻ

em, có cả trẻ dưới 1 tuổi, được báo cáo với tần suất hiếm gặp. Do đó, không nên sử dụng cho trẻ em quá nhỏ. Hiếm gặp các báo cáo về rối loạn chức năng gan, viêm gan, giảm bạch cầu trung tính có hồi phục ở những bệnh nhân được chỉ định mebendazole với liều chuẩn. Viêm cầu thận cũng được báo cáo khi sử dụng liều cao hơn khuyến cáo và điều trị kéo dài. Nên tránh sử dụng đồng thời mebendazole và metronidazole.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nên thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ và phụ nữ đang cho con bú.
Tác động lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc: Không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng lái xe.