


PHẦN

300mg phospholipid đậu nành - Dạng thuốc và hình thức trình bày: Viên 10 viên, hộp 5 vi



CHỈ ĐỊNH

Cho bệnh gan nhằm cải thiện các triệu chứng chủ quan, như ăn không ngon, cảm giác tức bên phải thượng vị do kèm dính đường (tổn thương gan vì nguyên nhân độc chất-dinh dưỡng) và trong viêm gan mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng đã biết với các chế phẩm đậu nành hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

LIỀU LƯỢNG

Cho trẻ trên 12 tuổi, thiếu niên và người lớn luôn luôn uống Essentiale Forte 300 mg đúng như sau: Mỗi lần uống 2 viên, ngày 3 lần. Nếu có điều gì không chắc chắn, bạn phải thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ.

CÁCH DÙNG

Essentiale Forte 300 mg được uống nguyên viên trong bữa ăn, không nhai, với nhiều nước (1 ly nước). Về cơ bản, không hạn chế thời gian dùng thuốc. Hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn cảm thấy tác dụng của Essentiale Forte 300 mg là quá mạnh hoặc quá yếu.

THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT

Nếu triệu chứng trở nặng hoặc có các triệu chứng không rõ ràng khác phải báo cho bác sĩ. Việc điều trị bằng thuốc này không thay thế cho việc tránh các chất độc hại gây tổn thương gan. Trong viêm gan mạn tính, liệu pháp bổ trợ với phospholipid đậu nành chỉ được cân nhắc khi trong thời gian điều trị khi triệu chứng chủ quan được cải thiện.

- **Trẻ em:** không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.
- **Có thai và nuôi con bằng sữa mẹ:** không được khuyến dùng trong khi có thai và cho con bú
- **Lái xe và sử dụng máy móc:** không có thận trọng đặc biệt.

CÁC TÁC DỤNG PHỤ

Đôi khi có thể xảy ra các rối loạn tiêu hóa, như đau bụng, phân mềm và tiêu chảy. Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng như nổi mẩn hoặc phát ban trên da. Ngưng dùng Essentiale Forte 300 mg và báo cho bác sĩ biết nếu thấy có tác dụng phụ hoặc nếu tác dụng phụ trở nên nặng hơn, hoặc nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào không được nêu trong tờ hướng dẫn này.

QUẢ LIỀU

Không có kinh nghiệm về quả liều Essentiale Forte 300 mg. Những tác dụng có thể tăng nặng. Trong trường hợp này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Nếu quên uống Essentiale Forte: Nếu không uống đủ số viên hoặc nếu quên uống một liều, không được tăng liều gấp đôi trong lần uống kế tiếp, mà tiếp tục uống thuốc theo toa bác sĩ hoặc theo chỉ dẫn trong tờ hướng dẫn này. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

NHÀ SẢN XUẤT

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Cologne, Đức.
Thông tin chi tiết liên hệ Sanofi-Aventis Việt Nam, số 10 Hàm Nghi Quận 1 TP. HCM. Điện thoại 84 8 38298526.