


EZETIMIBE + statin

Giảm LDL-C HIỆU QUẢ²



Giảm LDL-C hiệu quả¹

Trên bệnh nhân tăng cholesterol máu kèm đái tháo đường¹:



Giảm LDL-C tới 53.6%

Ở những bệnh nhân dùng phối hợp thuốc liều Ezetimibe/simvastatin 10/20mg

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU: Goldberg và cs (VYTAL): Dữ liệu từ một nghiên cứu đa trung tâm, mù đôi, ngẫu nhiên, đối chứng hoạt chất, 5 nhánh, nhóm song song (6 tuần điều trị tích cực, N=1.229). Nghiên cứu được thiết kế để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của ezetimibe/simvastatin 10/20 mg so với atorvastatin 10 mg và 20 mg, và ezetimibe/simvastatin 10/40 mg so với atorvastatin 40 mg trên bệnh nhân tăng cholesterol máu và ĐTĐ típ 2. Tiêu chí đánh giá chính là trung bình phần trăm thay đổi LDL-C so với ban đầu vào tuần thứ 6. Tiêu chí đánh giá phụ là phần trăm bệnh nhân đạt mục tiêu LDL-C theo NCEP ATP III <70 mg/dL sau 6 tuần điều trị tích cực.

Tài liệu tham khảo: 1. Goldberg RB, Guyton JR, Mazzone T, et al. Ezetimibe/simvastatin vs atorvastatin in patients with type 2 diabetes mellitus and hypercholesterolemia: the VYTAL study. Mayo Clin Proc. 2006;81(12):1579-1588.



Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của cục QLD-BYT:/...../QLD-TT, Ngày cấp:
 Ngày in tài liệu:
 Thông tin kê toa sản phẩm xin vui lòng xem trang 2
 Code :

