

TERPINE GONNON®

Terpine/Codeine 100mg/15mg



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thành phần:	Mỗi viên	Mỗi hộp 20 viên
Terpine (INN)	100 mg	2,00 g
Codeine (INN)	15 mg	0,30 g

Tá dược: Cellulose vi tinh thể (Vivapur® 102), talc, magnesium stearate, polyacrylate dispersion 30% (Eudragit NE 30D), natri saccharin, macrogol 6000, hydroxypropylmethylcellulose (Methocel® E5 hoặc Pharmacoat 606), titan dioxide (E171).

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Chỉ định: Terpine Gonnon được chỉ định dùng để giảm ho khan và ho do ngứa cổ ở người lớn.

Liều lượng và cách dùng:

Nếu việc điều trị không có hiệu quả, đừng tăng liều quá liều dùng khuyến cáo. Không dùng đồng thời với các thuốc chống ho khác mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Liều dùng thông thường như sau:

- Người lớn: uống mỗi lần 1 đến 2 viên, lặp lại sau 6 giờ nếu cần thiết, không uống quá 8 viên/ngày.
- Người lớn tuổi hoặc suy gan: giảm nửa liều dùng dành cho người lớn.

Khoảng cách và thời gian dùng thuốc: Các lần uống thuốc phải cách xa nhau ít nhất 6 giờ.

Khoảng thời gian điều trị: Việc điều trị phải trong thời gian ngắn (vài ngày) và chỉ giới hạn khi có ho.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 15 tuổi. Trẻ em dưới 18 tuổi và thực hiện cắt amidan và/hoặc thủ thuật nội V.A. Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Suy hô hấp. Ho suyễn. Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

Phụ nữ cho con bú: Kết hợp với các dẫn xuất có liên quan đến Morphine (buprenorphine, nalbuphine, pentazocine). Nếu có nghi ngờ, xin tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Cảnh báo đặc biệt: Không dùng thuốc này để điều trị chứng ho có đờm. Trong trường hợp này, ho là cơ chế tự nhiên cần thiết để khạc đờm. Nếu ho trở nên có đờm, hoặc kèm theo sung huyết, khạc đờm hoặc sốt, xin tham khảo ý kiến của bác sĩ. Trong trường hợp rối loạn phế quản hoặc phổi mãn tính, kèm theo ho và khạc đờm, thì cần thiết phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Không được dùng thuốc này chung với thuốc long đờm hoặc làm loãng đờm. Codein chỉ nên được sử dụng ở liều thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất. Không khuyến cáo sử dụng codeine cho trẻ em có các vấn đề liên quan đến hô hấp (ví dụ: khó thở hoặc thở khò khè khi ngủ...). Không nên sử dụng codeine ở những bệnh nhân đã được biết là "những người có chuyển hóa cực nhanh", nghĩa là họ có nhiều nguy cơ gặp phải những tác dụng phụ nghiêm trọng với codein hơn. Điều trị kéo dài ở liều cao có thể gây ra tình trạng lệ thuộc thuốc.

Thận trọng: Thận trọng trong trường hợp tăng áp suất nội sọ vì nó có thể gia tăng. Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp bệnh gan mãn tính. Không nên uống rượu và các thuốc có chứa rượu trong thời gian điều trị. Nếu có nghi ngờ, xin tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác: Để tránh xảy ra tương tác thuốc, đặc biệt là các chất chủ vận và kháng chủ vận Morphine (buprenorphine, nalbuphine, pentazocine), phải luôn thông báo các thuốc đang dùng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Thuốc này đã chứa một tác nhân chống ho là codeine. Không dùng các thuốc khác cũng chứa codeine và các tác nhân chống ho khác để tránh dùng quá liều tối đa khuyến cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Không nên dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai. Nếu phát hiện mang thai trong khi điều trị với Terpine Gonnon, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Thuốc này có thể bài tiết vào sữa mẹ. Dùng liều cao codeine cho người mẹ đang cho con bú có thể gây khó thở và giảm âm ở trẻ sơ sinh. Thuốc này chống chỉ định cho phụ nữ cho con bú. Theo qui luật chung, luôn luôn hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng thuốc trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

Người lái xe và vận hành máy móc: Đặc biệt người lái xe và vận hành máy móc cần chú ý đến nguy cơ buồn ngủ xảy ra khi dùng thuốc này. Hiện tượng này càng nặng thêm nếu có uống thêm rượu. Tốt nhất nên bắt đầu điều trị vào buổi tối.

Vận động viên: Vận động viên cần chú ý đến việc thuốc này có chứa một tác nhân có thể cho kết quả dương tính đối với thử nghiệm kiểm tra doping.

Tác dụng ngoại ý: Cũng giống như các thuốc khác, thuốc này có thể gây ít nhiều phiền toái ở một số người, có thể là: táo bón, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, nôn. Hiếm khi gặp: khó thở, các phản ứng dị ứng da. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc.

Quá liều: Trong trường hợp quá liều, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn

Bảo quản: Bảo quản dưới 30°C, tránh ẩm. Không dùng thuốc sau ngày hết hạn sử dụng.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: của nhà sản xuất

Nhà sản xuất: FAMAR LYON - 29 Avenue Charles de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL - PHÁP.

Tài liệu tham khảo: 1. Thông tin kê toa

VPĐD Merck KGaA tại TP. Hồ Chí Minh

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận - Tel: (84. 8) 38 420 100 - Fax: (84. 8) 38 420 130

VPĐD Merck KGaA tại Hà Nội

Lầu 10, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm - Tel: (84. 4) 39 748 860 - Fax: (84. 4) 39 748 861

mỗi 6 giờ⁽¹⁾

19/12/14

