

NEUROBION®

Vitamin B₁ B₆ B₁₂



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần:

Mỗi viên bao đường chứa: Vitamin B₁ (Thiamine mononitrat) 100 mg, Vitamin B₆ (Pyridoxine hydrochloride) 200 mg, Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) 200 µg.

Tà dược: Tinh bột ngô, bột Lactose, Methyl Cellulose, Magnesium Stearate, bột Talc mịn, nước khử ion.

Trình bày:

Hộp 5 vỉ, mỗi vỉ chứa 10 viên bao đường.

Chỉ định:

Viên bao đường Neurobion được chỉ định điều trị trong các trường hợp sau

Rối loạn thần kinh ngoại vi: Viêm đa dây thần kinh, đau dây thần kinh, đau thần kinh tọa, hội chứng vai – cánh tay, đau lưng – thắt lưng, đau thần kinh liên sườn, đau dây thần kinh sinh ba, tê các đầu chi...;

Giảm đau trong đau dây thần kinh.

Bệnh lý thần kinh trong đái tháo đường, do thuốc, do nghiện rượu.

Điều trị hỗ trợ trong đau khớp.

Các rối loạn do thiếu hụt vitamin B₁, B₆, B₁₂ (bệnh beri-beri, viêm dây thần kinh ngoại vi, thiếu máu nguyên bào sắt, chứng co giật ở trẻ em do thiếu pyridoxin ...).

Liều lượng và cách dùng:

Uống 1 đến 3 viên mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Viên bao đường Neurobion thích hợp cho việc điều trị tiếp theo điều trị bằng thuốc tiêm Neurobion 5000.

Chống chỉ định:

U ác tính, không dùng cho những bệnh nhân quá mẫn cảm hoặc dị ứng với thành phần của thuốc.

Thận trọng:

Không dùng phối hợp vitamin B₆ với levodopa.

Tương tác thuốc:

Vitamin B₆ làm giảm tác dụng của levodopa.



Tác dụng ngoại ý:

Hiện chưa ghi nhận các tác dụng ngoại ý của thuốc ở liều khuyến cáo. Xin thông báo cho bác sĩ các tác dụng ngoại ý gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Phụ nữ

1-3 viên/ngày



trong thời kỳ mang thai nếu sử dụng vitamin B₆ liều cao và kéo dài có thể gây hội chứng lệ thuộc thuốc ở trẻ sơ sinh.

Quá liều và xử trí:

Vitamin nhóm B có khoảng trị liệu rộng. Với liều lượng được khuyến cáo, đến nay không có triệu chứng quá liều nào được ghi nhận.

Hạn dùng:

3 năm kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc quá hạn ghi trên nhãn.

Bảo quản:

Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C.

Sản xuất tại:

PT Merck Tbk - Jl. TB. Simatupang no. 8, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia.

Đóng gói tại:

Công ty TNHH Pierre Fabre Việt Nam.

Địa chỉ: Số 1, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.

Điện thoại: +84 61 3836 770 - Fax: +84 61 3836 570.

Tiêu chuẩn:

Nhà sản xuất.

Nhà Phân Phối:

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu TW II

24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM.

Tài liệu tham khảo:

1. Thông tin kê toa

VPDD Merck KGaA tại TP. Hồ Chí Minh:

Lầu 9, CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận
Tel: (84. 8) 38 420 100 - Fax: (84. 8) 38 420 130

VPDD Merck KGaA tại Hà Nội:

Lầu 10, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm
Tel: (84. 4) 39 748 860 - Fax: (84. 4) 39 748 861



VNM/NEU/2013/018