



Thành phần: Povidone-iodine 1%. **Chỉ định:** Dùng điều trị viêm/ nhiễm khuẩn ở miệng, họng như: viêm họng, viêm miệng, viêm lợi, viêm amydan, nhiễm lạnh, cúm. Dùng dự phòng trong và sau phẫu thuật như cắt amydan và sau phẫu thuật nha khoa. Dùng thường kỳ để vệ sinh răng miệng. **Cách dùng và liều dùng:** Thuốc không nhuộm màu răng, da và quần áo nhưng có thể làm đổi màu răng giả, cần bỏ răng giả và các vật dụng khác ra khỏi miệng trước khi dùng thuốc. Sử dụng dung dịch không pha loãng, hoặc pha loãng với nước ấm cùng thể tích. Dùng dự phòng, để dung dịch tiếp xúc với miệng/ họng trong ít nhất 30 giây. Khi có tổn thương, súc miệng/ họng bằng dung dịch này trong 2 phút, dùng nhiều lần trong ngày (đặc biệt sau khi ăn). Nếu sau 2-5 ngày dùng thuốc đều đặn mà triệu chứng bệnh không cải thiện: hỏi ý kiến bác sĩ. Khi dùng cho trẻ em, cần đảm bảo là đã dùng chất chèn theo hướng dẫn. **Chống chỉ định:** không dùng thuốc khi mắc cảm với iod hoặc povidone hoặc có sự hoạt động quá mức của tuyến giáp, các bệnh lý khác của tuyến giáp, trước và sau khi trị liệu iod phóng xạ; trước khi làm nháy đồ iod phóng xạ hoặc điều trị iod phóng xạ trong ung thư biểu mô tuyến giáp. **Lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc:** Chỉ dùng tại chỗ. Ngừng dùng thuốc khi gặp kích ứng da, viêm da tiếp xúc hoặc mẫn cảm. Những bệnh nhân bị bướu cổ, bướu nhỏ tuyến giáp không được dùng liều cao hoặc kéo dài do có nguy cơ phát triển tăng năng tuyến giáp. Dùng liều tối thiểu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do nguy cơ cao về tăng năng tuyến giáp. Tránh tuyệt đối để trẻ nhỏ nuốt thuốc vào bụng. Giữ xa tầm tay trẻ em. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Chỉ dùng khi có chỉ định chặt chẽ với liều tối thiểu. Thuốc có thể ngấm vào nhau thai và tiết vào sữa mẹ gây ra thiếu năng tuyến giáp thoáng qua cho thai nhi hay trẻ sơ sinh. **Tác dụng phụ và phản ứng có hại:** Hiếm khi xảy ra phản ứng mẫn cảm da; có thể xuất hiện dưới dạng ngứa, ban đỏ, vết bong góp nhỏ hoặc các biểu hiện tương tự. Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng toàn thân cấp tính (hạ huyết áp, và/ hoặc khó thở). Điều trị dài ngày có thể dẫn đến hấp thu iod rõ rệt. Cá biệt, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tuyến giáp có thể tiến triển tăng năng tuyến giáp, mạch nhanh. Sau khi hấp thu lượng lớn các sản phẩm có iod, thấy xuất hiện mắt cần bằng điện giải, suy chức năng thận. Hãy thông báo cho bác sĩ mọi tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải. **Nhà sản xuất:** Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Thông tin sản phẩm xin liên hệ: VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd. ĐT: (08) 73001299

© BETADINE đã được đăng ký nhãn hiệu



Nguyen
22/12/2013

