



SÚC HỌNG

ĐỂ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ VIÊM HỌNG



BETADINE®

gargle & mouth wash



**VI KHUẨN
VI RÚT
VI NẤM**

Thuốc súc họng Betadine®, với hoạt chất PVP-I (Povidone-Iodine) Hiệu quả diệt các loại vi Khuẩn, vi rút, vi nấm gây viêm họng. Betadine® - Súc họng để điều trị hiệu quả viêm họng.

Thành phần: Povidone-Iodine 1%. **Chỉ định:** Dùng điều trị viêm/ nhiễm khuẩn ở miệng, họng như: viêm họng, viêm miệng, viêm lợi, viêm amidan, nhiễm lạnh, cúm. Dùng dự phòng trong và sau phẫu thuật như cắt amidan và sau phẫu thuật nha khoa. Dùng thường kỳ để vệ sinh răng miệng. **Cách dùng và liều dùng:** Thuốc không nhuộm màu răng, da và quần áo nhưng có thể làm đổi màu răng giả, cần bỏ răng giả và các vật dụng khác ra khỏi miệng trước khi dùng thuốc. Sử dụng dung dịch không pha loãng, hoặc pha loãng với nước ấm cùng thể tích. Dùng dự phòng, để dung dịch tiếp xúc với miệng/ họng trong ít nhất 30 giây. Khi có tổn thương, súc miệng/ họng bằng dung dịch này trong 2 phút, dùng nhiều lần trong ngày (đặc biệt sau khi ăn). Nếu sau 2-5 ngày dùng thuốc đều đặn mà triệu chứng bệnh không cải thiện: hỏi ý kiến bác sĩ. Khi dùng cho trẻ em, cần đảm bảo là đã dùng chất chẻ theo hướng dẫn. **Chống chỉ định:** Không dùng thuốc khi mắc cảm với Iod hoặc povidone hoặc có sự hoạt động quá mức của tuyến giáp, các bệnh lý khác của tuyến giáp, trước và sau khi trị liệu Iod phòng xạ; trước khi làm nháp nhạy đồ Iod phòng xạ hoặc điều trị Iod phóng xạ trong ung thư biểu mô tuyến giáp. **Lưu ý:** Chỉ dùng tại chỗ. Ngưng dùng thuốc khi gặp kích ứng da, viêm da tiếp xúc hoặc mẩn cảm. Dùng liều tối thiểu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do nguy cơ cao về tăng năng tuyến giáp. Tránh tuyệt đối để trẻ nhỏ nuốt thuốc vào bụng. Giữ xa tầm tay trẻ em. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Chỉ dùng khi có chỉ định chặt chẽ với liều tối thiểu. Thuốc có thể ngấm vào nhau thai và tiết vào sữa mẹ gây ra thiếu năng tuyến giáp toàn qua cho thai nhi hay trẻ sơ sinh. **Tắc dụng phụ và phản ứng có hại:** Hiếm khi xảy ra phản ứng mẩn cảm da; có thể xuất hiện dưới dạng ngứa, ban đỏ, vết bong gộp nhỏ hoặc các biểu hiện tương tự. Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng toàn thân cấp tính (hạ huyết áp, vã/ hoặc khó thở). Điều trị dài ngày có thể dẫn tăng hấp thu Iod rõ rệt. Cần biết, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tuyến giáp có thể tiến triển tăng năng tuyến giáp, mẩn nhanh. Sau khi hấp thụ lượng lớn các sản phẩm có Iod, thấy xuất hiện mắt cần băng điện giải, suy chức năng thận. Hãy thông báo cho bác sĩ một tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải. **Nhà sản xuất:** Mundipharma Pharmaceuticals Ltd, 13, Othelloos str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Thông tin sản phẩm xin liên hệ: VPPD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd.ĐT: (08) 73001299
Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Cục Quản lý dược xxxxxx/QĐ-TT
ngày/.....tháng/.....năm 2013. Ngày/.....tháng/.....năm.....in tài liệu.
© -BETADINE đã được đăng ký nhãn hiệu

