



SÚC HỌNG

ĐỂ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ VIÊM HỌNG



BETADINE®

gargle & mouth wash



VI KHUẨN
VI RÚT
VI NẤM

Thuốc súc họng Betadine®, với hoạt chất PVP-I (Povidone-Iodine) Hiệu quả diệt các loại vi khuẩn, vi rút, vi nấm gây viêm họng. Betadine® - Súc họng để điều trị hiệu quả viêm họng.

Thành phần: Povidone-iodine 1%. **Chỉ định:** Dùng điều trị viêm/ nhiễm khuẩn ở miệng, họng như: viêm họng, viêm miêng, viêm lợi, viêm amidan, nhiễm lạnh, cúm. Dùng dự phòng trong và sau phẫu thuật như cắt amidan và sau phẫu thuật nha khoa. Dùng thường kỳ để vệ sinh răng miệng. **Cách dùng và liều dùng:** Thuốc không nhuộm màu răng, da và quần áo nhưng có thể làm đổi màu răng già, cần bỏ răng giả và các vật dụng khác ra khỏi miệng trước khi dùng thuốc. Sử dụng dung dịch không pha loãng, hoặc pha loãng với nước ấm cùng thể tích. Dùng dự phòng, để dung dịch tiếp xúc với miệng/ họng trong ít nhất 30 giây. Khi có tổn thương, súc miệng/ họng bằng dung dịch này trong 2 phút, dùng nhiều lần trong ngày (đặc biệt sau khi ăn). Nếu sau 2-5 ngày dùng thuốc đều đặn mà triệu chứng bệnh không cải thiện: hỏi ý kiến bác sĩ. Khi dùng cho trẻ em, cần đảm bảo là đã dùng chất ché theo hướng dẫn. **Chống chỉ định:** Không dùng thuốc khi mắc cảm với iốt hoặc povidone hoặc có sự hoạt động quá mức của tuyến giáp, các bệnh lý khác của tuyến giáp, trước và sau khi trị liệu iốt phóng xạ; trước khi làm nhập nhảy đó iốt phóng xạ hoặc điều trị iốt phóng xạ trong ung thư biểu mô tuyến giáp. **Lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc:** Chỉ dùng tại chỗ. Ngừng dùng thuốc khi gặp kích ứng da, viêm da tiếp xúc hoặc mất cảm. Nhưng bệnh nhân bị bướu cổ bướu nhỏ tuyến giáp không được dùng liều cao hoặc kéo dài do có nguy cơ phát triển tăng năng tuyến giáp. Dùng liều tối thiểu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do nguy cơ cao về tăng năng tuyến giáp. Tránh tuyệt đối để trẻ nhỏ nuốt thuốc vào bụng. Giữ xa tầm tay trẻ em. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Chỉ dùng khi có chỉ định chặt chẽ với liều tối thiểu. Thuốc có thể ngấm vào nhau thai và tiết vào sữa mẹ gây ra triệu chứng tuyến giáp thoáng qua cho thai nhi hay trẻ sơ sinh. **Tắc dụng phụ và phản ứng có hại:** Hiếm khi xảy ra phản ứng mẫn cảm da; có thể xuất hiện dưới dạng ngứa, ban đỏ, vết bong gộp nhỏ hoặc các biểu hiện tương tự. Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng toàn thân cấp tính (thay huyết áp, vã mồ hôi khô thở). Điều trị dài ngày có thể dẫn đến hấp thu iốt rõ rệt. Cả bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tuyến giáp có thể tiến triển tăng năng tuyến giáp, mất nhanh. Sau khi hấp thu lượng lớn các sản phẩm có iốt, thấy xuất hiện mắt cần băng điện giải, suy chức năng thận. Hãy thông báo cho bác sĩ mọi tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải.

Nhà sản xuất: Mundipharma Pharmaceuticals Ltd, 13, Othellos str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Thông tin sản phẩm xin liên hệ: VPBD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd. ĐT: (081) 73001299
Số Giấy/ tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý thuốc xxx/xx/QĐ-DT,
ngày tháng năm 2013. Ngày tháng năm in lần đầu.

© BETADINE đã được đăng ký nhãn hiệu

