



HYCAMTIN[®] injection (Topotecan HCl)

Ung thư biểu mô buồng trứng di căn
sau khi thất bại với hóa trị đợt đầu
hoặc đợt kế tiếp⁽¹⁾


HYCAMTIN[®] injection (Topotecan HCl)

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HYCAMTIN IV

Nghiên cứu pha III, ngẫu nhiên, đa trung tâm: Bệnh nhân bị ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn tiến triển và đã thất bại với hóa trị bước 1 có sử dụng platinum: được truyền tĩnh mạch topotecan với liều 1,5mg/m²/ngày, trong 30 phút /ngày, trong 5 ngày liên tiếp hoặc truyền tĩnh mạch paclitaxel 175mg/m²/ngày trong thời gian 3 giờ ở ngày thứ 1, chu kỳ 21 ngày.⁽³⁾

* Tiêu chí chính: tỷ lệ đáp ứng, thời gian đáp ứng, thời gian đến khi bệnh tiến triển

* Tiêu chí phụ: thời gian đến khi đáp ứng, sống còn toàn bộ, độc tính.



Sau thời gian theo dõi 4 năm: Nhóm Topotecan có Trung vị thời gian sống còn là 63 tuần so với nhóm Paclitaxel 53 tuần (log-rank p=0.44)

Topotecan n= 112 paclitaxel n= 114