




HYCAMTIN[®] injection (Topotecan HCl)

HYCAMTIN phối hợp với cisplatin được chỉ định điều trị các bệnh nhân bị ung thư biểu mô cổ tử cung được xác định bằng tế bào học giai đoạn IV-B tái phát hoặc dai dẳng mà không thể điều trị tiết căn với phẫu thuật và/hoặc xạ trị⁽¹⁾

Nghiên cứu pha III, ngẫu nhiên đánh giá về chất lượng cuộc sống ở nhóm bệnh nhân được truyền Cisplatin (n=146) và nhóm bệnh nhân được truyền Cisplatin kết hợp Topotecan (n=147). Đánh giá chất lượng cuộc sống được hoàn tất ở bốn điểm thời gian.

Phác đồ Topotecan kết hợp với Cisplatin không giảm đáng kể đến chất lượng cuộc sống và tăng sống còn của bệnh nhân UNG THƯ CỔ TỬ CUNG giai đoạn tái phát hoặc dai dẳng so với cisplatin đơn độc.⁽⁶⁾



Điểm đánh giá

- Bảng khảo sát chất lượng cuộc sống dành bệnh nhân ung thư. Bộ câu hỏi được đánh giá trên thang 5 điểm, bắt đầu từ điểm 0 (rất tệ) và cao nhất là điểm 4 (rất tốt). Điểm cao nhất cho toàn bộ câu hỏi là 108 (tương ứng với Chất Lượng Cuộc Sống Tốt)⁽⁶⁾
- Điểm khảo sát chất lượng cuộc sống: Thang điểm FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư do chính BN tự báo cáo về 27 chi tiết phản ánh tình trạng sức khỏe, tình trạng chức năng, tình trạng gia đình/ xã hội và tình cảm của BN. Thang điểm này cho điểm từ 0 đến 4, trong đó điểm 0 = không có; điểm 1 = có một chút; điểm 2 = có thấy rõ; điểm 3 = có khá nhiều và điểm 4 = rất nhiều. BN được đánh giá theo thang điểm FACT-G vào 4 thời điểm: (lần 1) Ngay trước khi chia nhóm điều trị ngẫu nhiên; (lần 2) Trước chu kỳ hóa trị thứ 2; (lần 3) Trước chu kỳ hóa trị thứ 5 và (lần 4) Vào lúc 9 tháng sau khi chia nhóm điều trị ngẫu nhiên.⁽⁶⁾