



HYCAMTIN[®] injection

(Topotecan HCl)

26/12/2013

Sử dụng kéo dài topotecan (hơn 6 đợt điều trị) không tăng tỉ lệ độc tính về mặt huyết học⁽¹⁾

Tác dụng phụ về mặt huyết học do phác đồ Topotecan kết hợp với Cisplatin⁽⁶⁾

	Cisplatin (n=146)		Topotecan + Cisplatin (n=147)	
	Cấp độ 3	Cấp độ 4	Cấp độ 3	Cấp độ 4
Giảm bạch cầu trung tính	1	0	58	35
Giảm bạch cầu hạt	1	1	36	67
Thiếu máu	5	0	36	10
Nhiễm trùng	28	5	47	9
Tác dụng phụ khác	16	2	17	4

Tác dụng khác do phác đồ Topotecan kết hợp với Cisplatin⁽⁶⁾

	Cisplatin (n=146)		Topotecan + Cisplatin (n=147)	
	Cấp độ 3	Cấp độ 4	Cấp độ 3	Cấp độ 4
Nhiễm trùng	11	0	21	5
Thận	7	7	9	9
Buồn nôn	13	0	18	2
Nôn	13	0	20	2
Tác dụng phụ khác trên hệ tiêu hóa	12	3	16	4
Chuyển hóa	14	1	13	7
Thần kinh	1	0	1	0
Tác dụng phụ khác trên thần kinh	7	2	3	1
Tim mạch	7	3	7	6
Phổi	5	3	4	0
Đau	18	5	28	3
Thể chất	17	0	11	0
Xuất huyết	3	1	8	1
Gan	2	0	5	2