



M:

Potassium L-Aspartate, Dipotassium Glycyrrhizinate, Chlorpheniramine Maleate, Hydrochloride. **Chỉ định:** Mọi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các dị chất, mắt ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt, mỗi ngày 5 – 6 lần. **Chống chỉ định:** Không dùng cho người bị tăng nhãn áp. **Tác dụng phụ:** Có thể gây dị ứng ở những người có tiền căn dị ứng. **Liều dùng:** Kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng thuốc khi đau mắt nặng, thuốc có thể gây dị ứng mắt, đang theo một quá trình điều trị. 2. Trước khi dùng thuốc, chú ý: Dùng đúng liều; trẻ em dùng thuốc theo sự hướng dẫn của người lớn; không để mi mắt chạm vào dụng cụ đựng dịch do các chất tiết hoặc mầm vi sinh vật; không dùng thuốc bị đổi màu; không dùng thuốc sau khi dùng thuốc: Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ nếu thuốc gây dị ứng khác, không khỏi mờ mắt hoặc các triệu chứng không cải thiện sau khi dùng.

dùng



New V.Rohto - Cho đôi mắt khỏe đẹp

UM (VIỆT NAM) 16 VSIP, đường số 5, KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương • Tư vấn khách hàng: ĐT: (08) 3822 9322 • Email: enquiries@rohto.com.vn
Quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược .../.../ QLD – TT ngày... tháng... năm 2013

THUỐC NHỎ MẮT
NEW V.ROHTO®