

Thuốc bán theo đơn!
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Wobenzym[®] N

Viên bao dùng đường uống

THÀNH PHẦN

Mỗi viên bao đường uống Wobenzym[®] N bao gồm:
Pancreatin 100 mg, Papain 60 mg, Bromelain 45 mg,
Trypsin 24 mg, Chymotrypsin 1 mg, Rutin 50 mg.

CHỈ ĐỊNH

Wobenzym[®] N có thể sử dụng trong các trường hợp sau như một trị liệu thay thế cho các liệu pháp hiện sử dụng:

- Phù nề sau chấn thương, sau phẫu thuật.
- Phù bạch huyết, phù do huyết khối, phù sau xạ trị...
- Viêm nhiễm mãn tính hoặc tái phát (tai, mũi, họng; viêm xoang, tai giữa; hệ thống hô hấp trên và dưới; viêm phế quản...).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Wobenzym[®] N không dùng trong các trường hợp xuất huyết hoặc tan sợi huyết tiến triển. Không được dùng trong các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Sử dụng Wobenzym[®] N trong thời kỳ mang thai và cho con bú cần tư vấn bác sĩ.

THẬN TRỌNG

Thuốc không thay thế cho kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn nhưng làm tăng hiệu quả của thuốc. Khi dùng Wobenzym[®] N trên 2 tháng trong bệnh lý mãn tính, cần tư vấn bác sĩ.

Wobenzym[®] N có thể dùng cho trẻ em sau khi đã tư vấn với bác sĩ, người sẽ quyết định liều lượng sử dụng.

TÁC DỤNG PHỤ

Wobenzym[®] N dung nạp tốt, không phát hiện tác dụng phụ khi điều trị với liều cao, lâu dài. Thay đổi về màu sắc, mùi phân có thể xảy ra. Cảm giác đầy bụng và buồn nôn ngẫu nhiên là có thể khi dùng liều cao. Có thể tránh tác dụng phụ bằng cách sử dụng thuốc chia

nhỏ liều. Nếu triệu chứng tiếp tục xảy ra sau khi giảm liều, cần tư vấn bác sĩ. Phản ứng dị ứng (ban da) hiếm khi xảy ra và biến mất sau khi ngừng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không có bằng chứng về không tương thích của Wobenzym[®] N với các thuốc khác.

LIỀU LƯỢNG CÁCH DÙNG

Điều trị bắt đầu với liều 2 viên x 3 lần hàng ngày. Khi các dấu hiệu bệnh thuyên giảm, nên giảm liều từ từ xuống 1 viên x 3 lần hàng ngày. Uống thuốc, không nhai với một lượng nước lớn (ít nhất 250ml) và ít nhất 30 phút trước bữa ăn.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Hộp 2 vỉ, 40 viên bao.
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, dưới 25°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc sau khi đã hết hạn sử dụng.
Thông báo ngay cho bác sĩ khi gặp tác dụng phụ.

HẠN DÙNG:

30 tháng từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT:



PACIFIC Pharmaceuticals Ltd.
30Km Multan Road, Lahore- Pakistan