

DEPAKINE®


Sodium valproate / Valproic acid



Nghiên cứu SANAD:

So sánh hiệu quả điều trị lâu dài của valproate, lamotrigine, hoặc topiramate ở những bệnh nhân động kinh toàn thể hoặc động kinh khó phân loại ⁽²⁾

Hội chứng động kinh (%)*



*Thiếu dữ liệu về hội chứng động kinh trên một bệnh nhân dùng topiramate

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mở, ngẫu nhiên, có kiểm soát trên những bệnh nhân có động kinh toàn thể vô căn (63%) hay động kinh không phân loại được (27%) và được điều trị ở các phòng khám bệnh viện ở Anh Quốc. 716 bệnh nhân - valproate được xem là điều trị chuẩn cho các bệnh nhân này - được chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1: 1: 1 vào các nhóm dùng valproate, lamotrigine, hay topiramate từ tháng Giêng 1999 đến tháng Tám 2004; dữ liệu theo dõi được thu thập cho đến tháng Giêng 2006. ⁽²⁾

Tiêu chí đánh giá chính: thời gian cho đến khi thất bại điều trị và thời gian thuyên giảm bệnh - 1 năm

2. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, et al.: SANAD Study group. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet. 2007;369(9566):1016-1026