


# ộng kinh

15/01/2014

## Tỷ lệ bệnh nhân truyền giảm bệnh - 12 tháng

Tỷ lệ bệnh nhân đạt truyền giảm bệnh - 12 tháng theo đề cương trong thời gian nghiên cứu



Dữ liệu trình bày là tỷ số nguy cơ HR (hazard ratio) (khoảng tin cậy 95%)

HR > 1 để chỉ rằng thuốc lấy để so sánh sự truyền giảm bệnh 12 tháng nhanh hơn so với thuốc làm chuẩn

|             | Thuốc làm chuẩn (baseline drug) |                  |
|-------------|---------------------------------|------------------|
|             | Valproate                       | Lamotrigine      |
| Lamotrigine | 0,76 (0,62-0,94)                |                  |
| Topiramate  | 1,93 (0,76-1,15)                | 1,23 (0,99-1,51) |

Trong nghiên cứu SANAD, bệnh nhân bị thất bại điều trị chuyển sang 1 trong 3 thuốc khác: vì việc phân tích nhóm dự định điều trị bao gồm cả các dữ liệu động kinh sau thất bại điều trị, nên phải thực hiện phân tích theo đề cương.

2. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, et al.; SANAD Study group. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable Epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet. 2007;369(9566):1016-1026

# DEPAKINE®

Sodium valproate / Valproic acid

