

ĐÓNG GÓI

Nexium mups 20 mg: hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên.
Nexium mups 40 mg: hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị dùng qua ống thông dạ dày

1. Đặt viên thuốc vào trong một bơm tiêm thích hợp và làm đầy bơm tiêm bằng khoảng 25 mL nước và khoảng 5 mL không khí. Đối với một số ống thông, cần phải phân tán viên thuốc trong khoảng 50 mL nước để dễ phòng các vi hạt làm tắc ống.
2. Lắc ngay bơm tiêm trong khoảng 2 phút để phân tán đều viên thuốc.
3. Giữ đầu bơm tiêm hướng lên trên và kiểm tra xem đầu bơm tiêm có bị tắc không.
4. Gắn bơm tiêm vào ống thông trong khi vẫn giữ nguyên tư thế của bơm.
5. Lắc bơm tiêm và đặt đầu bơm tiêm hướng xuống dưới. Lắp tức bơm 5-10 mL vào ống thông. Đảo ngược bơm tiêm sau khi bơm và lắc (phải giữ cho đầu bơm tiêm hướng lên trên để tránh làm tắc đầu bơm).
6. Hướng đầu bơm tiêm xuống dưới và tiêm ngay lập tức 5-10 mL dịch phân tán vào trong ống thông. Lặp lại tiến trình này cho đến khi bơm tiêm hết thuốc.
7. Đổ đầy bơm tiêm bằng 25 mL nước và 5 mL không khí, lặp lại bước 5 nếu cần thiết để tráng sạch thuốc đọng lại trong bơm. Đốt với một số loại ống thông nên cần đổ đầy 50 mL nước.

NGÀY HIỆU ĐÍNH TOA THUỐC

Tháng 03/2013

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ.

THÔNG BÁO CHO BÁC SỸ BIẾT NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẤP PHẢI KHI DÙNG THUỐC.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

SỐ ĐĂNG KÝ: Nexium mups 20mg VN-11680-11, Nexium mups 40mg VN-11681-11



Nexium®
esomeprazole

40 mg

BỘT PHA DÙNG DỊCH TIÊM/TRUYỀN

THÔNG TIN KÊ TOA



Hygiene
12/13/14