

THUỐC LOÃNG ĐÀM CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

AMBROCO®

AMBROXOL

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

THÀNH PHẦN:

Mỗi 5 mL (1 muỗng cà phê) Xi-rô trẻ em chứa: Ambroxol Hydrochloride 15 mg
CHỈ ĐỊNH: Để điều trị các bệnh cấp và mãn tính của đường hô hấp có liên quan đến sự tiết bất thường của phế quản và sự vận chuyển chất nhầy bị suy giảm, đặc biệt là viêm phế quản mãn, viêm phế quản dạng hen và hen phế quản.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG: Dùng đường uống. Uống trước bữa ăn là tốt nhất

≤ 6 tháng	1,25 mL (1/4 muỗng cà phê)	mỗi 12 giờ
7 tháng đến 2 tuổi	2,5 mL (1/2 muỗng cà phê)	mỗi 12 giờ
2 đến 6 tuổi	2,5 mL (1/2 muỗng cà phê)	mỗi 8 giờ
7 đến 12 tuổi	5 mL (1 muỗng cà phê)	mỗi 8-12 giờ

Hoặc theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Dùng với ambroxol.

THẬN TRỌNG: Tình an toàn lúc có thai và lúc cho con bú chưa được chứng minh. Nên thận trọng khi dùng thuốc, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

TÁC DỤNG PHỤ: Nói chung, ambroxol được dung nạp tốt. Thỉnh thoảng những trường hợp bị đau đầu, tiêu nhiều, và mệt mỏi được báo cáo. Rối loạn tiêu hóa nhẹ như buồn nôn, nôn, và tiêu chảy có thể xảy ra. Cũng có vài trường hợp tăng tiết nhiều chất nhầy ở trẻ nhũ nhi.

Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không thấy tương tác thuốc với ambroxol. Có thể dùng ambroxol với các thuốc khác, đặc biệt là các thuốc thường dùng trong hội chứng phế quản như là corticosteroids, thuốc giãn phế quản, lợi tiểu và kháng sinh.

TRÌNH BAY: Hộp 1 chai 30 mL, 60 mL. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Để thuốc xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản phẩm AMBROCO® được sản xuất tại:

Công ty TNHH United International Pharma

Địa chỉ: Số 16 VSIP II, Đường số 7,

Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Đức, Tỉnh Bình Dương.

7/3/2014

4