

GIÚP HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT



CỐC LƯƠNG THUỐC PHÙ HỢP CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

HƯƠNG TRÁI CÂY DỄ UỐNG

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 mL (1 muỗng cà phê) sirô chứa: Kẽm nguyên tố 20 mg (dưới dạng kẽm sulfate monohydrate 55 mg)

CHỈ ĐỊNH: Dùng E-Zinc trong các trường hợp sau:

- Điều trị hỗ trợ tiêu chảy cấp.
- Nhiễm trùng tái diễn ở đường hô hấp, da.
- Giúp hỗ trợ tăng trưởng và phát triển thể chất.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong công thức.

THẬN TRỌNG: Nếu bệnh nhân quên một liều dùng, chỉ cần dùng liều kế tiếp và các liều tiếp theo như trong liều dùng đã khuyến cáo, tức là một lần mỗi ngày. Không dùng gấp đôi liều để nghĩ trừ khi được bác sĩ khuyến dùng. Nếu bệnh nhân đã dùng nhiều hơn liều để nghĩ, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

TÁC DỤNG PHỤ: Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa như buồn nôn và nôn được thấy khi dùng liều trên 30 mg kẽm nguyên tố.

Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Ngộ độc kẽm cấp tính hiếm khi xảy ra. Các dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng liều cao kẽm (4-8 gam) bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, có vị kim loại trong miệng và ngủ lịm.


Trong trường hợp quá liều, nên cho dùng các chất làm dịu như sữa; các chất tạo chelat như natri edetate có thể có ích.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không ghi nhận sự tương tác giữa thức ăn hoặc các thuốc khác với lượng kẽm có trong E-Zinc.

TRÌNH BÀY: Thuốc Sirô E-Zinc – Hộp 1 chai 60 mL.

Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến bác sĩ.



LIỀU LƯỢNG BỔ SUNG	
Nhóm tuổi	Uống 1 lần / ngày
1 - 3 tuổi	1.25 mL (1/4 muỗng cà phê)
4 - 8 tuổi	2.5 mL (1/2 muỗng cà phê)
9 - 13 tuổi	2.5 - 5 mL (1/2 - 1 muỗng cà phê)
Người lớn	2.5 - 5 mL (1/2 - 1 muỗng cà phê)

Hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ

Liều lượng trong điều trị hỗ trợ tiêu chảy cấp cùng với ORS có nồng độ thẩm thấu thấp	
Nhóm tuổi	Uống 1 lần / ngày trong thời gian tiêu chảy. Dùng trong 10-14 ngày ngay cả khi đã hết tiêu chảy
Dưới 6 tháng	2,5 mL hoặc 1/2 muỗng cà phê
Từ 6 tháng trở lên	5 mL hoặc 1 muỗng cà phê

Sản phẩm **e-Zinc** được sản xuất tại: Công ty TNHH United International Pharma
Địa chỉ: Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.