

THUỐC XỊT MŨI

NEDELIN

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ 15 ml có chứa:

Dexamethason natri phosphat.....15 mg
Oxymetazolin HCL.....7,5 mg
Tá dược và nước cất vừa đủ.....15 ml

(Tá dược gồm có: Kali hydrophosphat, Dinatri hydro phosphat, Natri metassulfít, Natri edetat, Benzalkonium clorid).

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp xịt có chứa 15ml dung dịch.

TÍNH CHẤT: Thuốc xịt mũi NEDELIN có chứa Oxymetazolin HCL, Dexamethason natri phosphat, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng nhanh và mạnh.

CHỈ ĐỊNH:

- Giảm tạm thời xung huyết mũi do cảm lạnh, viêm mũi, viêm xoang, sốt cỏ khô hoặc dị ứng đường hô hấp trên.
- Giảm sung huyết ở xoang.

LIỀU DÙNG:

- Chỉ dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.
- Ngày dùng 3 đến 4 lần, cách nhau 3 - 4 giờ.

CÁCH DÙNG:

- Lắc lọ thuốc vài lần, mở nắp bảo vệ.
- Dùng tay ấn vào nắp lọ, xịt thử trong không khí sau đó mới xịt vào mũi đồng thời hít nhẹ để thuốc vào sâu.
- Đậy nắp bảo vệ sau khi dùng.

Chú ý: - Thuốc chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ.

- Nếu cần thêm thông tin xin tham vấn ý kiến Bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Viêm mũi do nguồn gốc virus, do nấm.
- Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Không sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng với người tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh đường tuyến giáp.
- Không nên dùng quá liều vì có thể gây nóng, hắt hơi, nước mũi chảy nhiều hơn.
- Không dùng liên tục kéo dài, nếu dùng lâu dài phải có sự chỉ dẫn chuyên môn của bác sỹ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Có thể gây kích ứng tạm thời tại chỗ, nóng rát ở mũi và cổ họng, buồn nôn, nhức đầu, khô niêm mạc mũi.
- Có thể gây các phản ứng mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Ghi chú: Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Không nên phối hợp với các thuốc IMAO vì có thể gây cơn tăng huyết áp do Oxymetazolin ức chế sự chuyển hóa các acid amin gây co mạch. Do IMAO có tác dụng kéo dài, tương tác vẫn có thể xảy ra sau khi ngừng dùng IMAO đến 15 ngày.

TÁC DỤNG LÊN NGƯỜI ĐI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Vì thuốc có thể gây kích ứng tạm thời, nóng rát ở mũi và cổ họng, buồn nôn, nhức đầu, khô niêm mạc mũi. Do vậy đối với người đi tàu xe và vận hành máy móc nên thận trọng trong quá trình sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

- **Oxymetazolin hydroclorid:** Dùng quá nhiều hoặc trẻ em sơ ý uống nhầm có thể gây suy giảm nặng chức năng hệ thần kinh trung ương, có thể cần phải điều trị hỗ trợ tích cực.

- **Dexamethason:** Quá liều glucocorticoid gây ngộ độc cấp hoặc gây chết rất hiếm. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Không có chỉ định cho việc điều trị ngộ độc mạn, trừ trường hợp người bệnh quá nhạy cảm với corticosteroid, gây bệnh lý: lúc đó cần điều trị các triệu chứng. Choáng phản vệ hoặc phản ứng quá mẫn có thể được điều trị bằng epinephrin, hô hấp nhân tạo và aminophyllin. Người bệnh nên được giữ ấm và yên tĩnh.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thấy thuốc có biểu hiện màu, vẩn đục, nhãn thuốc in số mờ, hạn dùng mờ....hay các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc đến hỏi lại nơi bán hay nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

Không được uống
Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ

Nhà phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

93 Lĩnh Lang - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 04.3 7666 912 * FAX: 04.3 7666 914


Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

ĐT: 031.3745335 * FAX: 031.3745053

Sản xuất tại: Số 1 - Tây Sơn - Kiến An - Hải Phòng



4/3/2013