



CHO XƯƠNG CHẮC KHỎE MỖI NGÀY

Cùng Calcium Corbiere bổ sung nguồn Canxi thiết yếu cho mẹ và thai nhi, hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ em và điều trị loãng xương ở người lớn tuổi.

TÊN THUỐC: Calcium Corbiere và Calcium Corbiere S. **THÀNH PHẦN:** Calcium Corbiere 5ml: 0.55g Calcium gluconate, 0.05g Vitamin C, 0.025g Vitamin PP - 10ml: 1.1g Calcium gluconate, 0.1g Vitamin C, 0.05g Vitamin PP. Calcium Corbiere S viên sủi bột: 2.94g Calcium gluconate, 0.30g Calcium carbonate. **CHỈ ĐỊNH:** Calcium Corbiere: chế độ ăn thiếu calci, đặc biệt trong thời kỳ như cầu calci tăng (phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ trong giai đoạn tăng trưởng). Calcium Corbiere S: thiếu calci do nhu cầu tăng, cho điều trị loãng xương ở người lớn tuổi, hoặc sau thời kỳ mãn kinh, dùng thuốc corticoid, trong giai đoạn phục hồi vận động sau một thời gian bị bất động kéo dài. **LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:** Uống 5ml: Trẻ em: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Ông 10ml: Người lớn: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Trẻ em: 1 ống/ngày uống vào buổi sáng. Viên sủi: Hòa tan viên sủi bột trong ly nước. Người lớn: 1-3 viên/ngày (45-65mg calci ion/kg/ngày), chia làm nhiều lần. **CHÔNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với thành phần của thuốc; tăng calci huyết, calci niệu; sỏi calci; u ác tính phá hủy xương; loãng xương do bất động lâu ngày; suy tim và suy thận. Tránh dùng liều cao vitamin C ở bệnh nhân suy thận hoặc ở những người dùng thuốc có thể làm hỏng thận, do tăng nguy cơ suy thận. Calcium Corbiere có chứa vitamin PP không dùng cho người bệnh gan nặng, loét dạ dày tiền triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn) do bụng mất, cổ, ngứa, cảm giác rất bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da. Tác dụng không mong muốn của vitamin C thường gặp >1/100 tăng oxalat niệu. Ít gặp >1/1.000 đến <1/100: Máu, thiếu máu tán huyết. Tim mạch: đồ bụng mất, suy tim; Thận kinh trung ương: chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi; Dạ dày ruột: buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **THẬN TRỌNG:** Người có calci niệu tăng nhẹ, tổn thương chức năng thận, tiền sử sạn đường tiết niệu; có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, vàng da hoặc bệnh gan, gút, viêm khớp do gút. Thận trọng người theo chế độ ăn uống kiêng muối và cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong Calcium Corbiere (2,5g đường/ống 5ml, 5g đường/ống 10ml). Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, chất chống ung thư, thuốc điều trị HIV, barbiturat, estrogen, fluphenazin, hoặc bổ sung sắt. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, được si. Không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng quá nhiều loại vitamin và calci cũng các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. **NHÀ SẢN XUẤT:** Calcium Corbiere: Công ty CP DP Sanoi - Synthelabo VN, 15/6C Đặng Văn Bì, Thủ Đức, TP. HCM. Calcium Corbiere S: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM, số 4, đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Có số số hiệu giấy phép lưu hành: CT TNHH Sanoi-Aventis VN. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Sanoi-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (84 8) 38 29 8526, fax: (84 8) 3914 4801. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD:/QLD-TT, ngày/..... In tài liệu:/..... Số đăng ký: VN-19429-13, VD-9441-09, VN/CAC:13.09.10