

MAJ
26/4/14



CALCIUM corbière®



CHO XƯƠNG CHẮC KHỎE MỖI NGÀY

Cùng Calcium Corbière bổ sung nguồn Canxi thiết yếu cho mẹ và thai nhi, hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ em và điều trị loãng xương ở người lớn tuổi.

TÊN THUỐC: Calcium Corbière và Calcium Corbière S. **THÀNH PHẦN:** Calcium Corbière Ống 5ml: 0.55g Calci glucoheptonat, 0.05g Vitamin C, 0.025g Vitamin PP. Ống 10ml: 1.1g Calci glucoheptonat, 0.1g Vitamin C, 0.05g Vitamin PP. Calcium Corbière S viên sủi bọt: 2.94g Calci gluconolat, 0.30g Calci carbonat. **CHỈ ĐỊNH:** Calcium Corbière: chế độ ăn thiếu calci, đặc biệt trong thời kỳ nhu cầu calci tăng (phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ trong giai đoạn tăng trưởng). Calcium Corbière S: thiếu calci do nhu cầu tăng, cho điều trị loãng xương ở người lớn tuổi, hoặc sau thời kỳ mãn kinh, dùng thuốc corticoid, trong giai đoạn phục hồi vận động sau một thời gian bị bất động kéo dài. **LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:** Ống 5ml: Trẻ em: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Ống 10ml: Người lớn: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Trẻ em: 1 ống/ngày uống vào buổi sáng. Viên sủi: Hòa tan viên sủi bọt trong ly nước. Người lớn: 1-3 viên/ngày. Trẻ em: 1-2 viên/ngày (45-65mg calci ion/kg/ngày), chia làm nhiều liều. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với thành phần của thuốc; tăng calci huyết, calci niệu; sỏi calci; u ác tính phá hủy xương; loãng xương do bất động lâu ngày; suy tim và suy thận. Tránh dùng liều cao vitamin C ở những người có tình trạng dư acid, xơ gan, bệnh gút, nhiễm toan ống thận, hoặc tiểu hemoglobin kịch phát về đêm. Tránh dùng liều cao vitamin C ở bệnh nhân suy thận hoặc ở những người dùng thuốc có thể làm hỏng thận, do tăng nguy cơ suy thận. Calcium Corbière có chứa vitamin PP không dùng cho người bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn) đỏ bừng mặt, cổ, ngứa, cảm giác rất bỏng, buồn hoặc đau nhói ở da. Tác dụng không mong muốn của vitamin C thường gặp >1/100 tăng oxalat niệu. Ít gặp >1/1.000 đến < 1/100: Máu, thiếu máu tán huyết; Tim mạch: đỏ bừng mặt, suy tim; Thần kinh trung ương: chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi; Dạ dày-ruột: buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **THẬN TRỌNG:** Người có calci niệu tăng nhẹ, tổn thương chức năng thận, tiền sử sạn đường tiết niệu; có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, vàng da hoặc bệnh gan, gút, viêm khớp do gút. Thận trọng người theo chế độ ăn uống kiêng muối và cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong Calcium Corbière (2,5g đường/ống 5ml, 5g đường/ống 10ml). Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân ung thư, thiếu hụt men G6PD, thiếu máu, sỏi thận, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, hoặc sau khi ngưng mạch vành. Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, chất chống ung thư, thuốc điều trị HIV, barbiturat, estrogen, fluphenazin, hoặc bổ sung sắt. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ. Không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng quá nhiều loại vitamin và calci cùng các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. **NHÀ SẢN XUẤT:** Calcium Corbière: Công ty Cp DP Sanofi – Synthelabo VN, 15/6C Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP. HCM. Calcium Corbière S: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm IMEXPHARM, số 4, đường 30/4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cơ sở sở hữu giấy phép lưu hành: CT TNHH Sanofi-Aventis VN. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Sanofi-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (84 8) 38 29 8526, fax: (84 8) 3914 4801. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLĐ:/QLĐ-TT, ngày/..... In tài liệu/..... Số đăng ký: VN-19429-13, VD-9441-09. VN.CAC.13.09.11