



Tăng cường hiệu quả hạ áp^{2*}

Mức độ hạ áp của Telmisartan/Hydrochlorothiazide



Mục tiêu nghiên cứu:

đánh giá hiệu quả hạ áp của phối hợp Telmisartan và Hydrochlorothiazide so với đơn trị liều với Telmisartan hoặc Hydrochlorothiazide trên bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ đến trung bình.

Thiết kế nghiên cứu:

thử nghiệm đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng, nhóm song song theo thiết kế 4x5 trên 1293 bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ đến trung bình. Sau 4 tuần mù đơn, dùng placebo, các bệnh nhân bước vào 8 tuần mù đôi, giả đôi. Nghiên cứu so sánh giữa Telmisartan đơn trị 1 lần mỗi ngày (20, 40, 80 hoặc 160mg), Hydrochlorothiazide đơn trị (6,25, 12,5 hoặc 25mg), 12 dạng phối hợp Telmisartan và Hydrochlorothiazide các liều và placebo.

Tiêu chí đánh giá:

thay đổi của mức HA tâm trương đầy * giữa lần đánh giá sau cùng so với ban đầu trong suốt thời gian điều trị mù đôi

*: Mức HA tâm trương đo ở tư thế nằm ngửa tại thời điểm 24 giờ sau liều trước đó

HCTZ: Hydrochlorothiazide; HATTr: Huyết áp tâm trương; HATTh: Huyết áp tâm thu

- McGill, B. 2001. Telmisartan Plus Hdrochlorothiazide Versus Telmisartan or Hydrochlorothiazide Monotherapy in Patients with Mild to Moderate Hypertension. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Trial. Clinical Therapeutics. 23(6).pp:833-850

MICARDISPLUS
TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE