



Cho bệnh nhân thừa cân kèm Đái Tháo Đường và Tăng Huyết Áp^{3*}

Mức hạ áp thêm của telmisartan 80mg/HCTZ 12,5mg so với valsartan 160mg/HCTZ 12,5mg sau 10 tuần điều trị



Thay đổi huyết áp tâm thu trung bình so với ban đầu của telmisartan 80mg/HCTZ 12,5mg và valsartan 160mg/HCTZ 12,5mg sau 10 tuần điều trị



HCTZ: Hydrochlorothiazide

Mục tiêu nghiên cứu:

so sánh hiệu quả hạ áp lúc sáng sớm của telmisartan 80mg/HCTZ 12,5mg và valsartan 160mg/HCTZ 12,5mg trên 840 bệnh nhân THA thừa cân kèm ĐTĐ típ 2, theo dõi bằng huyết áp lưu động 24 giờ

Thiết kế nghiên cứu:

thử nghiệm lâm sàng tiền cứu, ngẫu nhiên, mở nhãn, mù kết cục, đa trung tâm, sau 2-4 tuần dùng mù đơn giả được, bệnh nhân cho dùng 1 lần mỗi ngày telmisartan 80mg hoặc valsartan 160mg trong 4 tuần, thêm HCTZ 12,5mg trong 6 tuần.

Tiêu chí đánh giá: thay đổi huyết áp tâm thu và tâm trương trung bình trong suốt 6 giờ sau cùng của khoảng liều 24 giờ.

3. Sharma, M. et al. (2007) Telmisartan/hydrochlorothiazide versus valsartan/hydrochlorothiazide in obese hypertensive patients with type 2 diabetes: the SMOOTH study. Cardiovascular Diabetology. Vol.6.Issu.28

MICARDISPLUS
TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE