




LEVITRA[®] ODT

Viên nén tan trong miệng ● vardenafil 10mg

Hiệu quả trên bệnh nhân có hoặc không có bệnh lý đài tháo đường, rối loạn lipid và tăng huyết áp⁽³⁾

Một nghiên cứu phân tích tổng hợp các dữ liệu của hai nghiên cứu pha III đã trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, so sánh vardenafil viên nén ODT 10 mg với placebo trên 686 nam có RLC được phân tầng theo tuổi tác (< 65 tuổi so với > 65 tuổi) và các bệnh lý như đài tháo đường, rối loạn lipid máu hay tăng huyết áp.

Tiêu chí đánh giá chính dựa trên chỉ số chức năng cương quốc tế (IIEF-EF) và trả lời câu hỏi liên quan tình dục (SEP-2 và SEP-3)



*p<0.0001 Vardenafil ODT so với giả dược,
**p=0.221, §p=0.973, †p=0.999
*** LS mean SEP-3 success rate (%): tỉ lệ trả lời thành công trung bình câu hỏi SEP-3 bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

SEP-2 (Sexual Encounter Profile Question-2): Đặc điểm câu hỏi về tình dục gặp phải
- Câu hỏi số 2: Bạn có thể đưa dương vật vào âm đạo của bạn tình không?

4

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

