

TÀI LIỆU DÀNH CHO CÔNG CHÚNG

CÔNG THỨC : cho 1 gói 20 g

Nhôm phosphate gel 20% 12,38 g

Tá dược vừa đủ 1 gói

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:

Nhôm phosphat được dùng như một thuốc kháng acid dịch dạ dày dưới dạng gel nhôm phosphat (một hỗn dịch) và dạng viên nén. Nhôm phosphat làm giảm acid dịch vị dư thừa nhưng không gây trung hòa: Gel dạng keo tạo một màng bảo vệ tựa chất nhầy che phủ diện rộng niêm mạc đường tiêu hóa. Lớp màng bảo vệ gồm nhôm phosphat phân tán mịn làm liền nhanh ổ viêm và loét, bảo vệ niêm mạc dạ dày chống lại tác động bên ngoài và làm người bệnh dễ chịu ngay.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Bình thường thuốc không được hấp thu vào cơ thể và không ảnh hưởng đến cân bằng acid - kiềm của cơ thể.

Nhôm phosphat hòa tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrocloric để tạo thành nhôm clorid và nước. Ngoài việc tạo nhôm clorid, nhôm phosphat còn tạo acid phosphoric. Khoảng 17 - 30% lượng nhôm clorid tạo thành được hấp thu và nhanh chóng được thận đào thải, ở người có chức năng thận bình thường. Nhôm phosphat không được hấp thu sẽ đào thải qua phân.

Nhôm phosphat có khả năng trung hòa chỉ bằng một nửa của nhôm hydroxyd, nhưng ưu điểm hơn là không làm ảnh hưởng đến sự hấp thu phosphat của đường ruột (100 mg nhôm hydroxyd khan có khả năng trung hòa 5 mili đương lượng (5 mEq) acid.

CHỈ ĐỊNH:

Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, kích ứng dạ dày, các hội chứng thừa acid như rất bỏng, ợ chua, và hiện tượng tiết nhiều acid.

Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khi dùng quá nhiều nicotin, cafe, kẹo, hoặc thức ăn quá nhiều gia vị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc kháng acid có thể làm giảm hiệu lực của các thuốc khác. Nếu dùng cùng lúc với một thuốc khác nên cách nhau khoảng 2 giờ.

THẬN TRỌNG:

Tránh điều trị liều cao lâu dài ở người bệnh suy thận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp: Táo bón.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không ảnh hưởng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có thông tin.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG :

Thuốc được chỉ định lúc có cơn đau hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ 1-2 gói/lần, không dùng quá 6 lần/ngày.

Uống thuốc giữa bữa ăn hoặc khi có cơn đau.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI : Hộp 26 gói x 20 g .

BẢO QUẢN : Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

Eftilugel

Nhôm phosphat ở thể keo 20%



SDK: VD - 17872 - 12

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Trụ sở chính: Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP.HCM

Nhà máy sản xuất: 930C2 Đường C KCN Cát Lái, Cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM

Phòng kinh doanh: Số 601, Lầu 3, CMT8, P.15, Q.10, TP.HCM


Điện thoại: (848) 3977 0965 - 3977 0966 - 3977 0967 * Fax: (848) 3977 0968

Website: www.ft-pharma.com * **Email:** phongkinhdoanh@ft-pharma.com

Trang 2

Ngày 01 tháng 11 năm 2013

Tổng Giám Đốc



DS. Lê Thanh Sử