

Bisolvon® Kids

Khi bạn hay con bạn bị ho có đàm?

Bisolvon® Kids. Hết đàm, sẽ hết ho thôi!



2/5/2013



Hiệu quả

nờ tác dụng phổi hợp



Hương



Bisolvon® Kids - Thuốc ho long đàm cho trẻ em

THÀNH PHẦN: 4mg bromhexine HCL/5ml sirô. **CHỈ ĐỊNH:** Làm loãng đờm trong các bệnh phế quản phổi cấp và mạn tính có kèm theo sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy suy yếu. **LIỀU LƯỢNG:** Khi bắt đầu điều trị, có thể cần thiết phải tăng tổng liều hàng ngày lên 48mg ở người lớn. Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: 10ml x 3 lần/ ngày; trẻ 6-12 tuổi: 5ml x 3 lần/ ngày; trẻ 2-6 tuổi: 2,5ml x 3 lần/ ngày; trẻ < 2 tuổi: 1,25ml x 3 lần/ ngày. **CHỐNG**

CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân nhạy cảm với bromhexine hoặc các thành phần khác của thuốc; bệnh di truyền hiếm gặp có thể không dung nạp với một tá dược. **THẬN TRỌNG:** Rất ít tổn thương da nghiêm trọng như hội chứng Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc. Tham khảo ý kiến bác sĩ và ngừng thuốc nếu xuất hiện tổn thương mới ở da và niêm mạc. Bisolvon Kids chứa 17,142mg sorbitol cho tổng liều tối đa/ ngày. Không dùng cho bệnh nhân bắt dung nạp với fructose. Có thể nhuận tràng nhẹ. **TÁC DỤNG PHỤ:** Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng; phản ứng phản vệ: sốc phản vệ, phù mạch, co thắt phế quản, phát ban, mày đay, ngứa và các phản ứng quá mẫn khác. **KHẢ NĂNG SINH SẢN, THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ:** Không nên dùng Bisolvon trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Thận kỳ: Dữ liệu sử dụng bromhexine cho phụ nữ mang thai còn giới hạn. Những

nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản. Cho con bú: Chưa rõ liệu bromhexine/các chất chuyển hóa có được tiết vào sữa mẹ hay không. Dữ liệu sẵn được về được lực học/độc tính trên động vật cho thấy sự bài tiết của bromhexine/các chất chuyển hóa vào sữa mẹ. Không thể loại trừ nguy cơ đối với trẻ bú mẹ. Khả năng sinh sản: Chưa tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của BISOLVON đến khả năng sinh sản ở người. Dựa trên kinh nghiệm tiền lâm sàng, không có dấu hiệu cho thấy bromhexine có thể tác động đến khả năng sinh sản. **SẢN XUẤT:** PT. Boehringer Ingelheim Indonesia, Jl. Lawang Gintung No.89, Bogor, Indonesia cho: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Germany. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. MỌI THÔNG TIN SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ:** Lầu 14, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM. Tel: (08) 38236919. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: xxxx/xx/QLD-TT, ngày .. tháng .. năm.... Ngày .. tháng .. năm .. in tài liệu.

