



Bayer (South East Asia) Pte Ltd
63 Chulia Street
OCBC Centre, 14th Floor
Singapore 049514

Supradyn® - viên sủi bột bổ sung đa Vitamin, Khoáng chất và nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể.

Tên thuốc Supradyn®. Hương vị chanh. **Thành phần:** Vitamin B1: 9mg; vitamin B2: 10,2mg; vitamin B3: 40mg; vitamin B5: 7,4mg; vitamin B6: 3mg; vitamin B12: 4mcg; vitamin C: 80mg; vitamin D3: 7,5mcg; vitamin E: 10mg; vitamin H: 0,2mg; Folic Acid: 0,2mg; Khoáng chất: Canxi: 100mg; Magnesi: 9mg; Sắt: 1,5mg; Đồng: 0,5mg; Kẽm: 1mg; Mangan: 0,5mg.

SDK: VN-12181-11.
Chỉ định: Bổ sung đa vitamin/đa khoáng chất cho trẻ vị thành niên trên 12 tuổi và người lớn, bao gồm cả người già để dự phòng và điều trị thiếu vitamin, thiếu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau do giảm hấp thu hoặc tăng nhu cầu bổ sung.

Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc đã được biết đến;
- Đang dùng thuốc hóa sắt và/hoặc đồng;
- Đang thừa vitamin D;
- Tăng canxi máu;
- Suy giảm chức năng thận.

Liều dùng và cách sử dụng: Một viên nên sủi bột dùng hàng ngày cho người lớn và trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên. Cách dùng: Để viên thuốc tan hết trong một cốc nước (200ml) rồi uống. Thông tin dành cho bệnh nhân dài tháo đường: Giá trị năng lượng của viên nên sủi bột Supradyn® tương đương 6,71 kcal. Lượng này không có ý nghĩa với chế độ ăn của bệnh nhân dài tháo đường. Do đó, không gặp vấn đề gì khi chỉ định viên nên sủi bột Supradyn® cho bệnh nhân dài tháo đường.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Có thể sử dụng Supradyn® trong thời kỳ có thai và cho con bú; tuy nhiên, không được dùng quá liều được khuyến cáo. Tương tự như các thuốc khác, cần tham khảo ý kiến của Bác Sĩ. Việc sử dụng quá liều Vitamin D liên tục sẽ gây hại cho thai nhi và trẻ sơ sinh. Cần cần nhắc xem liệu có đang cho trẻ dùng bất kỳ nguồn bổ sung riêng lẻ nào không.

Các cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử dụng
Không dùng quá liều được khuyến cáo. Liều rất cao một số thành phần, nhất là vitamin D, sắt và đồng có thể gây hại tới sức khỏe. Bệnh nhân dùng chế phẩm bổ sung đơn lẻ một vitamin hoặc đa vitamin, các thuốc khác hoặc đang điều trị y khoa cần tham khảo ý kiến của cán bộ y tế trước khi dùng thuốc này. Đặc biệt, các bệnh nhân đang dùng thuốc kháng vitamin K và/hoặc thuốc chống đông khác cần xin ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Bệnh nhân phenylketon niệu không nên sử dụng viên nên sủi bột Supradyn® do chế phẩm

này có chứa phenylalanin (aspartam); Viên nên sủi bột Supradyn® có chứa 301 mg natri. Thành phần natri trong các dạng bào chế củ có thể khác với lượng này. Cần cần nhắc cần thận ở những bệnh nhân có chế độ ăn cần kiểm soát lượng natri.

Viên nên sủi bột Supradyn® không chứa lactose.

Tác dụng không mong muốn: Thông thường, thuốc này dùng nạp tốt. Tuy nhiên, trong một số lượng hiếm các trường hợp, các triệu chứng trên đường tiêu hóa có thể xảy ra (như khó chịu vùng bụng, táo bón, nôn, ỉa chảy và buồn nôn). Rất hiếm gặp các trường hợp sử dụng thuốc gây ra phản ứng dị ứng. Những triệu chứng này bao gồm mề đay, sưng tấy mắt, thro khó khê, đỏ bừng da, ban da, bông rộp da và sốt. Nếu xảy ra phản ứng dị ứng, nên ngưng điều trị và tham khảo ý kiến của các cán bộ y tế. Lưu ý rằng nước tiểu có thể chuyển màu vàng nhạt. Điều này không có hại và là do chế phẩm có chứa vitamin B2.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc có bán tại tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhà sản xuất: **PT Bayer Indonesia**, Jl. Raya Bogor Km 32, Depok, 16416, Indonesia.

Mọi chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:
ĐT: (08) 9105920 - Fax: (08) 9105919
Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược XXXXXXOLD-TT, ngày... tháng... năm.....; Ngày, tháng, năm in tài liệu.../.../.....

