

PleavazTM - 10/20

Viên nén Atorvastatin 10 & 20 mg

Thải trừ: Atorvastatin và các chất chuyển hóa được thải trừ chủ yếu qua mật, tiếp đó là qua gan và chuyển hóa ngoài gan. Tuy nhiên, atorvastatin không đi vào vòng tuần hoàn gan ruột. Thời gian bán thải trung bình của thuốc trong huyết tương là khoảng 14 giờ, còn thời gian giảm một nửa hoạt tính ức chế HMG-CoA reductase kéo dài khoảng 20-30 giờ nhờ hoạt tính của các chất chuyển hóa. Dưới 2% liều atorvastatin sử dụng theo đường uống được tìm thấy trong nước tiểu.

Ở bệnh nhân mắc bệnh gan do uống rượu kéo dài, nồng độ atorvastatin trong huyết tương tăng lên đáng kể.

Chỉ định:

o Dự phòng bệnh tim mạch

Với những bệnh nhân trưởng thành không biểu hiện triệu chứng lâm sàng nhưng mang nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh mạch vành như tuổi tác, hút thuốc, tăng huyết áp, mức HDL-C thấp hoặc tiền sử gia đình có người mắc bệnh mạch vành sớm, atorvastatin được chỉ định để:

- Làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim
- Làm giảm nguy cơ đột quỵ
- Làm giảm nguy cơ phải phẫu thuật tái thông động mạch vành và đau thắt ngực

Với bệnh nhân đái tháo đường loại 2 không biểu hiện triệu chứng lâm sàng nhưng mang nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh mạch vành như bệnh võng mạc, albumin niệu, hút thuốc hoặc tăng huyết áp, atorvastatin được chỉ định để:

- Làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim
- Làm giảm nguy cơ đột quỵ

Với bệnh nhân biểu hiện triệu chứng mắc bệnh mạch vành, atorvastatin được chỉ định để:

- Làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim không tử vong
- Làm giảm nguy cơ đột quỵ tử vong và không tử vong
- Làm giảm nguy cơ phải phẫu thuật tái thông động mạch vành
- Làm giảm nguy cơ phải nhập viện do suy tim sung huyết
- Làm giảm nguy cơ đau thắt ngực

o Atorvastatin được chỉ định như một thuốc hỗ trợ cho chế độ dinh dưỡng để làm giảm nồng độ cholesterol toàn phần, LDL-C, apo B và TG và làm tăng HDL-C ở những bệnh nhân sau:

- Tăng cholesterol máu nguyên phát (dị hợp tử có hoặc không mang tính gia đình)
- Rối loạn lipid máu hỗn hợp (Nhóm IIa và IIb theo phân loại của Fredrickson)
- Tăng nồng độ triglycerid huyết thanh (Nhóm IV theo phân loại của Fredrickson)
- Rối loạn betalipoprotein máu nguyên phát (Nhóm III theo phân loại của Fredrickson)

o Atorvastatin được chỉ định như một thuốc hỗ trợ cho các thuốc hạ lipid khác để làm giảm cholesterol toàn phần và LDL-C ở bệnh nhân tăng cholesterol máu đồng hợp tử có tính gia đình.

Trước khi bắt đầu sử dụng atorvastatin, cần loại trừ các nguyên nhân thứ phát gây tăng cholesterol máu (như kém kiểm soát bệnh đái tháo đường, thiếu năng giáp trạng, bệnh thận, rối loạn protein máu, bệnh gan, các thuốc gây tăng cholesterol máu, nghiện rượu) và cần đánh giá các chỉ số lipid như cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C và TG.

Chống chỉ định:

- Bệnh gan hoặc tăng transaminase huyết thanh dai dẳng không rõ nguyên nhân.
- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú

Thân trọng và cảnh báo:

Cần cân nhắc khi dùng thuốc thuộc nhóm statin đối với bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương



glenmark

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

3 rd Floor, Vinaconex Building, 47, Dien Bien Phu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: +84 8 3910 4952 Fax: +84 8 3910 4835

Sản xuất tại Plethico Pharmaceutical Limited
A3. Road, Manglia - 453771, Indore MP, India.