

PleavazTM - 10/20

Viên nén Atorvastatin 10 & 20 mg

cơ. Thuốc thuộc nhóm statin có nguy cơ gây ra các phản ứng có hại đối với hệ cơ như teo cơ, viêm cơ, đặc biệt đối với các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như bệnh nhân trên 65 tuổi, bệnh nhân bị bệnh thiếu năng tuyến giáp không được kiểm soát, bệnh nhân bị bệnh thận. Cần theo dõi chặt chẽ các phản ứng có hại trong quá trình dùng thuốc.

- o Rối loạn chức năng gan: Các thuốc ức chế HMG-CoA reductase có thể gây ra các rối loạn sinh hóa tại gan. Do đó, cần đánh giá chức năng gan trước khi sử dụng và tại thời điểm 12 tuần sau khi dùng thuốc cũng như khi tăng liều và định kỳ 6 tháng một lần.
- o Nên thận trọng khi dùng atorvastatin cho bệnh nhân uống nhiều rượu và có tiền sử mắc bệnh gan.
- o Đã có báo cáo về tiêu cơ vân cùng với suy thận cấp thứ phát do myoglobin niệu khi sử dụng các thuốc thuộc nhóm statin. Do đó, nên tạm ngưng hoặc ngừng sử dụng atorvastatin ở bất kỳ bệnh nhân nào có nguy cơ mắc bệnh cơ hoặc tiến triển suy thận thứ phát do tiêu cơ vân.
- o Nên thận trọng khi sử dụng thuốc ức chế HMG-CoA reductase cùng với các thuốc làm giảm nồng độ hoặc hoạt tính của các hormone steroid nội sinh như ketoconazol, spironolacton và cimetidin.
- o Thận trọng khi lựa chọn thuốc tránh thai cho phụ nữ đang dùng atorvastatin do atorvastatin có thể làm tăng giá trị AUC (diện tích dưới đường cong) của norethindron và ethinylestradiol lần lượt khoảng 30% và 20%.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- o Chỉ nên sử dụng atorvastatin cho phụ nữ mang thai sau khi những phụ nữ này đã nhận thức rõ và được thông báo về những nguy hiểm tiềm tàng. Nếu bệnh nhân có thai khi đang dùng atorvastatin, cần ngừng thuốc và thông báo cho bệnh nhân biết những nguy hiểm tiềm tàng đối với thai nhi.
- o Do thuốc có thể gây ra các tác dụng bất lợi cho trẻ bú mẹ nên những phụ nữ đang sử dụng atorvastatin không nên cho con bú.

Tương tác thuốc:

Việc dùng cùng với các thuốc ức chế enzym CYP3A4 có thể làm tăng nồng độ của Atorvastatin trong huyết tương dẫn đến tăng nguy cơ bệnh cơ và tiêu cơ vân. Khi dùng phối hợp với Amiodarone, không nên dùng quá 20mg/ ngày vì làm tăng nguy cơ gây ra chứng tiêu cơ vân. Đối với những bệnh nhân phải dùng liều trên 20mg/ ngày mới có hiệu quả điều trị, bác sĩ có thể lựa chọn thuốc statin khác (như Pravastatin).

- o Nguy cơ mắc bệnh cơ tăng lên khi sử dụng các thuốc thuộc nhóm statin cùng với cyclosporin, các dẫn chất của acid fibric, niacin (acid nicotinic), erythromycin và các thuốc chống nấm azol.
- o Sử dụng atorvastatin cùng với các thuốc antacid làm giảm nồng độ atorvastatin trong huyết tương khoảng 35%.
- o Nồng độ atorvastatin trong huyết tương giảm xuống khoảng 25% khi dùng đồng thời với colestipol.
- o Khi sử dụng đa liều atorvastatin cùng với digoxin, nồng độ digoxin trong huyết tương tăng lên gần 20%.
- o Nồng độ atorvastatin trong huyết tương tăng lên khoảng 40% khi sử dụng đồng thời với erythromycin do erythromycin là thuốc ức chế cytochrom P450 3A4.

Tác dụng bất lợi:

- o Atorvastatin thường được dung nạp tốt. Các tác dụng bất lợi thường chỉ ở mức độ nhẹ và thoáng qua.
- o Các tác dụng bất lợi thường gặp nhất bao gồm đau đầu, táo bón, đầy hơi, khó tiêu, đau bụng và đau khớp.
- o Đã có báo cáo về tình trạng tiêu cơ vân cùng với suy thận cấp thứ phát do myoglobin niệu khi sử dụng các thuốc ức chế HMG-CoA reductase.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.



Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

3 rd Floor, Vinaconex Building, 47, Dien Bien Phu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: +84 8 3910 4952 Fax: +84 8 3910 4835
Sản xuất tại Plethico Pharmaceutical Limited
A3, Road, Manglia - 453771, Indore MP, India.