

PleavazTM - 10/20

Viên nén Atorvastatin 10 & 20 mg

Liều lượng và cách dùng:

Khuyến cáo bắt đầu điều trị với liều thấp nhất mà thuốc có tác dụng, sau đó nếu cần thiết, có thể điều chỉnh liều theo nhu cầu và đáp ứng của từng người bằng cách tăng liều từng đợt cách nhau không dưới 4 tuần và phải theo dõi các phản ứng có hại của thuốc, đặc biệt là các phản ứng có hại đối với hệ cơ.

Khi dùng phối hợp với Amiodarone, không nên dùng quá 20mg/ngày.

Liều sử dụng từ 10-80 mg, uống một lần mỗi ngày.

- o Tăng cholesterol máu (dị hợp tử có hoặc không mang tính gia đình) và rối loạn lipid máu hỗn hợp (Nhóm IIa và IIb theo phân loại của Fredrickson): 10-20 mg một lần mỗi ngày. Liều sử dụng cho bệnh nhân cần đạt mục tiêu giảm mạnh LDL-C (> 45%): 40mg một lần mỗi ngày.
- o Tăng cholesterol máu dị hợp tử có tính gia đình ở bệnh nhân nhi (10-17 tuổi): 10mg mỗi ngày, có thể tăng liều lên tối đa 20mg/ ngày.
- o Tăng cholesterol máu đồng hợp tử có tính gia đình: 10-80 mg mỗi ngày. Nên sử dụng atorvastatin như một thuốc hỗ trợ cho các biện pháp điều trị hạ lipid khác (như tách thành phần LDL trong máu) hoặc khi không thể áp dụng được các biện pháp điều trị này.

Cách dùng

- o Bệnh nhân nên tuân theo chế độ ăn giảm cholesterol trước khi sử dụng atorvastatin và nên tiếp tục tuân theo chế độ ăn này trong suốt quá trình điều trị.
- o Có thể uống atorvastatin một lần trong ngày tại bất kỳ thời điểm nào, trong hoặc ngoài bữa ăn.
- o **Nên điều chỉnh liều khởi đầu và liều duy trì cho từng bệnh nhân, tùy theo mục tiêu điều trị.**
- o Sau khi bắt đầu dùng thuốc và/ hoặc trong quá trình dò liều, nên theo dõi nồng độ lipid trong 2-4 tuần và điều chỉnh liều theo kết quả thu được.

Quá liều:

Chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu trong trường hợp quá liều atorvastatin. Khi xảy ra quá liều, cần điều trị triệu chứng và áp dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ nếu cần.

Trình bày:

Hộp 2 vỉ x 14 viên nén.

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

Đề xa tầm với của trẻ em

Sản xuất tại:

Plethico Pharmaceutical Limited.

A.B.Road, Manglia-453 771, Indore MP, India.



Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

3 rd Floor, Vinaconex Building, 47, Dien Bien Phu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: +84 8 3910 4952 Fax: +84 8 3910 4835
Sản xuất tại Plethico Pharmaceutical Limited
A3, Road, Manglia - 453771, Indore MP, India.