


BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ KÉO DÀI > 1 NĂM

Tỉ lệ biểu hiện ban đầu của các biến cố không mong muốn theo chu kỳ điều trị sorafenib ⁽²⁾



Phần lớn biến cố không mong muốn đều ở độ 1 hay độ 2 và xảy ra sớm trong quá trình điều trị ⁽²⁾

Theo Hutson TE et al. Eur J Cancer. 2010;46(13):2432-2440.

- ❗ Biến cố không mong muốn xảy ra ở chu kỳ 1 nhiều hơn các chu kỳ sau ⁽²⁾
- ❗ Phản ứng da lòng bàn tay - chân (HFSR) và phát ban / bong vảy giảm đáng kể sau khi chu kỳ 1 ⁽²⁾

Các biến cố không mong muốn thường gặp nhất khi điều trị lâu dài với Sorafenib ⁽²⁾

Tác dụng không mong muốn (liên quan đến điều trị)	Bệnh nhân điều trị với Sorafenib > 1 năm (n=169) ⁽²⁾		TARGET Sorafenib (N=451) ⁽³⁾	
	Tất cả các độ	Độ 1 và độ 2	Tất cả các độ	Độ 1 và độ 2
Tiêu chảy	74	72	43	41
Phát ban / tróc da	51	50	40	39
HFSR	50	43	30	24
Rụng tóc	39	39	27	26
Mệt mỏi	38	35	37	32

Không có độc tính bất ngờ hoặc tích lũy xảy ra với điều trị lâu dài ⁽¹⁾

HFSR = hand foot syndrome reaction: phản ứng da lòng bàn tay - chân

- ❗ Đa số biến cố không mong muốn đều ở độ 1 và độ 2 ⁽²⁾
- ❗ Tỉ lệ ban đầu của các biến cố không mong muốn độ 3 và độ 4 cho thấy các biến cố này không xấu đi theo thời gian tiếp tục điều trị ⁽²⁾

Việc điều trị bao gồm cả kiểm soát các độc tính và biến cố không mong muốn của thuốc có thể giúp kiểm soát tốt khối u cho bệnh nhân. ⁽²⁾

thuccat
5/9/13