


Motilium-M[®]

Domperidone Maleate 12.72mg



NHANH CHÓNG HẾT TRIỆU CHỨNG ĐẦY BỤNG, KHÓ TIÊU

Motilium M giúp tăng cường vận động dạ dày, nhanh chóng làm giảm các triệu chứng ăn không tiêu như đầy bụng, căng tức bụng, ợ hơi ...

Thành phần:

Mỗi viên nén bao phim chứa: 12,72mg Domperidone maleate tương đương 10 mg domperidone. Viên 10 viên, hộp 10 vỉ

Chỉ định:

Các triệu chứng ăn không tiêu liên quan đến chậm làm rỗng dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản và viêm thực quản như: cảm giác đầy bụng, mau no, căng tức bụng, đau bụng trên, trướng bụng, đầy hơi, ợ hơi, nóng rát sau xương ức. Buồn nôn và nôn do nhiều nguyên nhân khác, đặc biệt do dùng thuốc đồng vận dopamin ở bệnh nhân Parkinson.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn và thiếu niên (cân nặng từ 35kg trở lên): 1-2 viên/lần x 3-4 lần/ngày. Không quá 8 viên mỗi ngày. Nên uống trước bữa ăn 15-30 phút

Chống chỉ định:

Không dùng Motilium-M đối với bệnh nhân quá mẫn với domperidone hoặc bất cứ tá dược nào của thuốc, u tuyến yên tiết prolactin, tổn thương gan mức độ vừa và nặng hoặc khi việc kích thích vận động dạ dày có thể gây nguy hiểm như đang bị xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột cơ học, thủng tiêu hóa. Dùng đồng thời với ketoconazole đường uống, erythromycin, hoặc các thuốc ức chế mạnh CYP3A4 làm kéo dài khoảng QTc như fluconazole, voriconazole, clarithromycin, amiodarone và telithromycin.

Chú ý và thận trọng đặc biệt khi sử dụng:

Không phù hợp cho bệnh nhân không dung nạp lactose và galactose. Phụ nữ đang dùng thuốc Motilium-M không nên cho con bú: do domperidone tiết ra theo sữa mẹ, chưa biết có hại trên trẻ sơ sinh hay không. Sử dụng ở trẻ nhũ nhi và trẻ em: Viên nén Motilium-M không phù hợp ở trẻ em có cân nặng ít hơn 35kg. Giảm liều trong suy thận: khi dùng Motilium M điều trị dài ngày cần giảm ở mức 1-2 lần/ngày, tùy vào mức độ suy thận trầm trọng như thế nào.



Phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng trong thai kỳ: Có ít dữ liệu về việc sử dụng Domperidone ở phụ nữ có thai. Chỉ nên dùng Motilium-M trong thai kỳ khi đánh giá và tiên lượng lợi ích điều trị.

Sử dụng khi cho con bú: Chưa rõ có gây hại cho trẻ sơ sinh hay không vì thế phụ nữ đang dùng thuốc Motilium-M không nên cho con bú.

Tác dụng ngoại ý:

Trong thử nghiệm lâm sàng: Ở $\geq 1\%$ bệnh nhân: Trầm cảm, Lo âu, Giảm/mất khả năng hoạt động tình dục, đau đầu, buồn ngủ, mất vận động, tiêu chảy, mẩn đỏ, ngứa, vú to, căng ngực, tiết sữa, mất kinh, đau ngực, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn tiết sữa, suy nhược. Ở $< 1\%$ bệnh nhân: Quá mẫn, mê đay, vú tăng tiết, sưng vú. Sau khi đưa thuốc ra thị trường: rất hiếm: phản ứng quá mẫn, kích động, lo âu, rối loạn ngoại tháp, co giật, đột tử do bệnh tim, loạn nhịp thất nghiêm trọng, phù mạch, bí tiểu, xét nghiệm chức năng gan bất thường, tăng prolactin máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

OLIC (Thailand) Ltd-166 Moo 16 Bangpa-In Industrial Estate, Udomsornayuth Road, Bantgpa-In District, Ayutthaya Province, Thái Lan.

Cơ sở nhượng quyền sản xuất: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse, Bỉ

Phân phối bởi:

Vimedimex Bình Dương, số 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, KCN VSIP2, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thông tin sản phẩm xin liên hệ:

VPND Janssen-Cilag, 35 Nguyễn Huệ, Q1, Tp HCM.

ĐT: (TP.HCM) 3821 - 4828, (Hà Nội) 3936 - 3323.

Handwritten signature and date:
5/9/13