



NHÓM NGHIÊN CỨU KHÔNG ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN (n=233)⁽⁴⁾



NHÓM NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐIỀU TRỊ CYTOKINE TRƯỚC ĐÓ (n=202)⁽⁴⁾



PAZOPANIB: kéo dài PFS một cách đáng kể so với giả dược ở các bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào thận di căn / tiến xa không được điều trị toàn thân trước đó.⁽⁴⁾

PAZOPANIB: kéo dài PFS một cách đáng kể so với giả dược ở các bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào thận di căn / tiến xa đã được điều trị với cytokine trước đó.⁽⁴⁾

NHÓM BỆNH NHÂN KHÔNG ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN	PAZOPANIB	GIẢ DƯỢC
PFS (trung vị)	11,1 tháng*	2,8 tháng
Đáp ứng	32%	4%

*p<0,001 so với giả dược

NHÓM BỆNH NHÂN ĐÃ ĐIỀU TRỊ CYTOKINE	PAZOPANIB	GIẢ DƯỢC
PFS (trung vị)	7,4 tháng*	4,2 tháng
Đáp ứng	29%	3%

*p<0,001 so với giả dược

Handwritten signature