



Votrient® Dung nạp tốt(2,4) pazopanib

Đa số tác dụng không mong muốn ghi nhận được của PAZOPANIB ở cấp độ 1 hoặc 2. (4)

có nghiên cứu
hại trên nhữn
tình trạng lâm
việc thực hiện
MUỒN: Tính ẽ
giả trong một
tại chỗ và/hoặc
hoặc sử dụng
thắng đối với
vào MedDRA. 1
< 1/10. ỉt gặp
liệu thử nghiệm
bạch cầu trung
hóa và dinh dưỡng
gặp Đau đầu. Thử
Các rối loạn trên
tim (như giảm phĩ
gặp Tăng huyết ập
tiêu hóa. Xuất hũ
Thường gặp Khó tĩ
Rất thường gặp T
thường chức năng
tóc. **Thường gặp** P
thesia syndrome).
thân và tai chĩ:
nghiệm xuất hiện
VOTRIENT với liệu
giới hạn liều) và tĩ
và 1.000 mg hàng
hạn chế về quá liẽ
của Trung tâm th
pazopanib vì pazo
Bởi: Glaxo Operat
Glaxo Wellcome S
Cổ phần Dược liệu
VOTRIENT là nhĩ

Tài liệu tham khảo:

1. Thông tin kê toa Vo
2. Sternberg CN, et al.
abstract 3021.
3. Kumar R, et al. Mye
4. Sternberg CN, et al. I

CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN THƯỜNG GẶP (4)

Tiêu chảy	PAZOPANIB (n=290)			GIẢ DƯỢC (n=145)		
	Cấp độ			Cấp độ		
	Tất cả (%)	3 (%)	4 (%)	Tất cả (%)	3 (%)	4 (%)
52	3	<1	9	<1		
Cao huyết áp	40	4	10	<1		
Đổi màu tóc, lông	38	<1	3			
Buồn nôn	26	<1	9			
Chán ăn	22	2	10	<1		
Ói mửa	21	2	<1	8	2	
Mệt mỏi	19	2	8	1	1	
Suy nhược	14	3	8			
Đau bụng	11	2	1			
Đau đầu	10		5			

Tác dụng không mong muốn được đánh giá cấp độ theo: tiêu chuẩn thuật ngữ của Viện Ung thư Quốc gia đối với các biến cố bất lợi, phiên bản 3 (NCI CTCAE) v 3.0