



Votrient® pazopanib

Liều uống 1 lần/ngày

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

LIỀU KHUYẾN CÁO CỦA VOTRIENT LÀ 800MG 1 LẦN/NGÀY



UỐNG NGUYÊN VIÊN

LÚC ĐÓI (tối thiểu 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau bữa ăn)

ĐIỀU CHỈNH LIỀU:⁽¹⁾

- Chỉ nên giảm liều ban đầu từ 800mg xuống 400 mg mỗi ngày.
- Việc điều chỉnh liều tiếp theo, hoặc tăng hoặc giảm phải tuân theo mô hình bậc thang, mỗi bậc 200mg.
- Nên tránh dùng đồng thời các tác nhân ức chế mạnh CYP 3A4.
- Nếu dùng đồng thời các tác nhân ức chế mạnh CYP 3A4, nên giảm liều VOTRIENT xuống 400mg

Không cần chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan nhẹ.

- Giảm liều VOTRIENT xuống 200mg mỗi ngày ở bệnh nhân suy gan trung bình.

- Chưa nghiên cứu trên bệnh nhân suy gan nặng.

Không cần chỉnh liều ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinine ≥ 30 ml/phút.

Không cần chỉnh liều, tần suất sử dụng ở bệnh nhân trên 65 tuổi.

Handwritten signature: 3/10/2017

Liều dùng