


GLUCOPHAGE[®] XR 1 lần mỗi ngày

metformin

Việc chuyển từ metformin phóng thích tức thời sang metformin phóng thích kéo dài có liên quan đến giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa bất kỳ từ 26% xuống 11% ⁽¹⁾

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu tại 4 trung tâm ở Hoa Kỳ trên 468 bệnh nhân có đầy đủ dữ liệu phân tích nhằm đánh giá mức độ dung nạp trên đường tiêu hóa của dạng metformin phóng thích kéo dài và metformin phóng thích tức thời. Kết quả trong một phân tích thêm dưới nhóm ở 205 bệnh nhân chuyển từ metformin IR sang metformin XR



THÔNG TIN KÊ TOA

GLUCOPHAGE[®] XR

Metformin hydrochloride - viên phóng thích kéo dài.

Thuốc bán theo đơn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

THÀNH PHẦN:

GLUCOPHAGE[®] XR 750 mg: Metformin hydrochloride 750 mg.

GLUCOPHAGE[®] XR 1000 mg: Metformin hydrochloride 1000 mg.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

GLUCOPHAGE[®] XR 750 mg: hộp 2 vỉ x 15 viên.

GLUCOPHAGE[®] XR 1000 mg: hộp 3 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị đái tháo đường typ 2 ở người lớn, đặc biệt ở bệnh nhân quá cân, khi chế độ ăn kiêng và tập thể dục đơn thuần không hiệu quả trong kiểm soát đường huyết. Glucophage XR có thể được dùng như đơn trị liệu hoặc phối hợp với các thuốc trị đái tháo đường đường uống khác hoặc với insulin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Đơn trị liệu hoặc phối hợp với các thuốc trị đái tháo đường đường uống khác.

Glucophage XR 750 mg: Dùng để điều trị duy trì cho những bệnh nhân đang được điều trị với metformin (dạng phóng thích tức thời hoặc phóng thích kéo dài). Liều lượng Glucophage XR 750 mg nên tương đương với liều dùng hàng ngày của metformin hydrochloride, tối đa là 1500 mg uống vào bữa ăn tối. Sau 10 đến 15 ngày nên kiểm tra sự tương thích về liều lượng của Glucophage XR 750 mg dựa trên việc đo lường đường huyết.

Glucophage XR 1000 mg: Nên uống ngày 1 lần vào bữa ăn tối với liều khuyến cáo tối đa 2 viên/ngày. Glucophage XR 1000 mg được dùng để điều trị duy trì cho những bệnh nhân đang được điều trị với metformin hydrochloride 1000 mg hoặc 2000 mg. Khi chuyển qua Glucophage XR, liều dùng hàng ngày của Glucophage XR nên tương đương với liều dùng hàng ngày của metformin hydrochloride. Ở những bệnh nhân được điều trị với metformin hydrochloride với liều dùng hàng ngày hơn 2000 mg, không khuyến cáo chuyển sang dùng Glucophage XR. Đối với những bệnh nhân mới điều trị với metformin hydrochloride, liều khởi đầu thông thường của Glucophage XR là 500 mg, ngày/1 lần vào bữa ăn tối. Sau 10 đến 15 ngày liều lượng nên được điều chỉnh dựa trên việc đo lường đường huyết. Sự tăng liều chậm có thể cải thiện sự dung nạp của dạ dày ruột. Nếu đường huyết không được kiểm soát được với liều tối đa 2000 mg Glucophage XR, ngày 1 lần, nên cân nhắc việc dùng ngày 2 lần với thức ăn vào bữa ăn sáng và bữa ăn tối. Nếu đường huyết vẫn không đạt được, bệnh nhân có thể được chuyển sang dùng metformin hydrochloride thông thường với liều tối đa hàng ngày là 3000 mg. Khi chuyển từ 1 thuốc trị đái tháo đường đường uống khác, nên bắt đầu với Glucophage XR 500 mg trước khi chuyển sang dùng Glucophage XR 1000 mg như được trình bày ở trên.

Phối hợp với insulin:

Glucophage XR 750 mg: Những bệnh nhân đã được điều trị metformin phối hợp với insulin, liều lượng của Glucophage XR 750 mg nên tương đương với liều dùng hàng ngày của metformin, tối đa 1500 mg uống vào bữa ăn tối, trong khi liều lượng của insulin được điều chỉnh dựa trên việc đo lường đường huyết.

Glucophage XR 1000 mg: Metformin hydrochloride và insulin có thể được



Chức vụ
11/9/13