




Điều trị dài hạn saizen® cho trẻ thiếu nội tiết tăng trưởng (GH)



Nghiên cứu mở trên 69 trẻ thiếu GH với thời gian điều trị trung bình là 64,4 tháng ⁽¹⁾



(*) n: Số lượng bệnh nhân của từng thang điểm đánh giá

- **Sự phát triển chiều cao trung bình so với ban đầu là $47,5 \pm 8,5$ cm trong 7 năm ⁽¹⁾**
- **Trẻ bắt kịp chiều cao và chiều cao được cải thiện theo từng năm trong 7 năm đầu điều trị. ⁽¹⁾**
- **Chỉ có 24 trong tổng số 2111 báo cáo ghi nhận được về tác dụng phụ (1,1%) có liên quan đến điều trị: ⁽¹⁾**
 - 19 trường hợp liên quan đến rối loạn tại chỗ tiêm: phản ứng tại chỗ tiêm (8), đau tại chỗ tiêm (7), bỏng rát tại chỗ tiêm (2), teo tại chỗ tiêm (1), áp-xe tại chỗ tiêm (1)
 - 5 trường hợp khác: dị cảm (3), bất thường dung nạp glucose (1), suy giáp (1)



*Chức vụ
19/9/13*