



Secnidazole

2g

THÀNH PHẦN: Secnidazol khan 2g.

Tá dược: vi hạt trung tính, Polyvidone, Polyethyleneglycol 4000, Polyme este của acid metacrylic (Eudragit NE30D), talc, silic keo khan (Aerosil 200) vừa đủ một gói 4,181g (Thành phần của vi hạt trung tính: Saccharose tinh bột.)

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc cốm đóng trong gói. Hộp 1 gói.

CHỈ ĐỊNH: Viêm niệu đạo, viêm âm đạo do *Trichomonas Vaginalis*; Nhiễm amip ở ruột; Nhiễm amip ở gan.

LIỀU DÙNG:

Viêm niệu đạo, viêm âm đạo do *Trichomonas Vaginalis*:

Người lớn: liều duy nhất 1 gói (2g) dùng trước bữa ăn.

Nhiễm amip ở ruột

- **Nhiễm amip cấp tính có triệu chứng (dạng histolytica):** Người lớn: liều duy nhất 1 gói (2g) dùng trước bữa ăn. Trẻ em: liều duy nhất 30mg/kg/ngày, chỉ dùng 1 ngày.

- **Nhiễm amip không có triệu chứng (dạng minuta và dạng nang):** liều mỗi ngày tương tự như trên, dùng trong 3 ngày.

Nhiễm amip ở gan

Người lớn: 1,5g/ngày, dùng một lần hoặc chia làm nhiều lần, trong 5 ngày, dùng trước bữa ăn.

Trẻ em: 30mg/kg/ngày, dùng một lần hoặc chia làm nhiều lần, trong 5 ngày.

Lưu ý: Nên kết hợp điều trị bằng secnidazole và dẫn lưu ổ mủ hoặc áp xe trong trường hợp bị amip gan ở giai đoạn mưng mủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với các dẫn xuất của imidazole hoặc một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ cho con bú.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG: Tránh dùng các thức uống có chứa cồn trong thời gian điều trị bằng secnidazole. Tránh dùng thuốc trong trường hợp có tiền sử rối loạn đông máu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- **Phụ nữ có thai:** Kết quả nghiên cứu trên thú cho thấy không gây quái thai, do đó việc thuốc gây dị tật ở thai nhi ở người là không thể. Thực tế, cho đến nay, các thuốc gây dị tật trên thai người đều có tác động gây quái thai trên thú qua những

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

nghiên cứu được theo dõi chặt chẽ trên 2 loài. Trên lâm sàng, hiện chưa có dữ liệu đủ tính thuyết phục để đánh giá tác dụng gây dị tật hoặc độc tính trên bào thai có thể xảy ra khi dùng Secnidazole trong thai kỳ.

- **Phụ nữ cho con bú:** không có dữ liệu về việc thuốc vào sữa mẹ. Tuy nhiên, đã có tài liệu cho thấy các dẫn xuất của imidazole khác có vào sữa mẹ và gây ra các trường hợp nhiễm nấm *Candida* ở miệng-hậu môn cũng như các trường hợp tiêu chảy ở trẻ em bú sữa mẹ đang được điều trị bằng các dẫn xuất imidazole khác. Vì thế, cần theo dõi trên lâm sàng đối với trẻ sơ sinh hoặc thậm chí ngưng cho con bú trong thời gian điều trị.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi dùng các dẫn xuất imidazole.

- Thường gặp nhất: rối loạn tiêu hóa kèm theo đau dạ dày, thay đổi vị giác (vị kim loại), viêm lưỡi, viêm dạ dày;

- Giảm bạch cầu trung bình, có thể phục hồi khi ngưng điều trị.

- Hiếm gặp: chóng mặt, mất phối hợp vận động và mất điều hòa, dị cảm, viêm đa dây thần kinh cảm giác vận động.

Ghi nhận với Secnidazole cho đến nay:

- Hiếm gặp rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn, đau dạ dày);

- Hiếm gặp phản ứng quá mẫn xảy ra tức thì: sốt, phát ban, nổi mề đay, phù mạch.

Nên thận trọng khi dùng thuốc này cho người lái xe và sử dụng máy móc vì có thể gây buồn ngủ, mất phối hợp vận động

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên kết hợp:

- Disulfiram: cơn hoang tưởng, trạng thái lú lẫn.

- Cồn: tác động như hội chứng cai rượu (bốc hỏa, đổ mồ hôi, tim đập nhanh). Nên tránh dùng thức uống có cồn và các loại thuốc có chứa cồn.

Thận trọng khi kết hợp:

Các thuốc uống chống đông máu (mô tả cho warfarin): gia tăng hiệu lực của thuốc uống chống đông và nguy cơ gây xuất huyết do giảm chuyển hóa thuốc ở gan.

Kiểm tra thường xuyên nồng độ prothrombin và theo dõi giá trị I.N.R. Điều chỉnh liều dùng của thuốc uống chống đông trong thời gian điều trị bằng secnidazole và 8 ngày sau khi dùng điều trị.

NHÀ SẢN XUẤT: MACORS

Rue des Caillottes, ZI Plaine des Isles, 89000 Auxerre - Pháp

TEDIS

VPĐD Công ty TEDIS

TP. HCM: Tòa nhà C, Tầng 4,
150 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7.
Tel : 84. 8. 54 135 188 - Fax : 84. 8. 54 135 185

Hà Nội: Tòa nhà Giảng Võ Lake View, Phòng 202,
Đ10 Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel : 84. 4. 37 723 819 - Fax : 84. 4. 37 723 820

Công ty Phân Phối

Công ty TNHH Dược Phẩm Đan Thanh
2/15-17 Bàu Bàng - P. 13 - Q. Tân Bình, Tp. HCM.
Tel: 84. 8. 38 635 717 - Fax: 84. 8. 32 651 585

Shereck
9/9/13