




Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

progestogel[®]
progestérone

● progesterone
tác dụng tại chỗ

VN-15147-13



BESINS
HEALTHCARE

TEDIS

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM
Cao ốc C, 150 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7
Tel : 84. 8. 54 135 188 - Fax: 84. 8. 54 135 185
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI
Tòa nhà Giảng Võ Lake View, P. 202,
Đ10 Giảng Võ, Q. Ba Đình
Tel : 84. 4. 37 723 819 - Fax : 84. 4. 37 723 820

Số giấy tiếp nhận HSDK tài liệu thông tin thuốc
của cục QLĐ-BYT:/...../QLĐ-TT,
ngày ... tháng ... năm ... In ngày ... tháng ... năm ...
Thông tin sản phẩm xem trang 2



progestogel[®]
progestérone

Thành phần: Progesteron 0.8g.

Tá dược: octyldodecanol, carbomer 980, dầu thầu dầu polyoxyethylene hydro hóa, trolamine, cồn, nước tinh khiết vừa đủ 80g.

Dạng bào chế: Gel. Hộp 1 ống 80g và thước đo chia liều.

Chỉ định: Điều trị các bệnh vú lạnh tính: đau vú đơn thuần hoặc kết hợp với bệnh vú lạnh tính.

Liều lượng và cách dùng: Bôi ngoài da. Bôi 1-2 thước đo liều, mỗi thước chứa khoảng 2,5g gel, trên mỗi vú đã được rửa sạch trước đó. Xoa nhẹ cho đến khi thuốc thấm hết qua da. Bóp ống thuốc theo rãnh trên thước đo liều để tạo 1 đơn vị liều. Điều trị cần phải liên tục mỗi ngày trong tháng kể cả thời kỳ hành kinh. Thời gian điều trị trung bình là 3-6 tháng. Liều tối đa mỗi ngày là 5g. Không sử dụng thuốc này để điều trị cho trẻ em.

Tác dụng không mong muốn: Đã ghi nhận một vài trường hợp bị quá mẫn hoặc kích ứng da không đặc thù. Trong 1 số trường hợp, chu kỳ kinh nguyệt có thể sớm hơn 1-2 ngày nhưng không ảnh hưởng tới lượng kinh. Sự chế tiết giống hoàng thể nhẹ đã được ghi nhận, tuy nhiên tác dụng này không giống như khi dùng một liều tương đương theo cách thông thường. **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Chống chỉ định: Mẫn cảm với progesterone hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Nên vệ sinh sạch sẽ vùng ngực và tay khi bôi thuốc. Nếu chu kỳ kinh nguyệt không đều, có thể kết hợp thuốc này với progesterone hoặc progestatif uống. Chỉ bôi ngoài da, không được uống. Điều trị này không phải là một thuốc ngừa thai. Không loại trừ nguy cơ bị phản ứng phụ không mong muốn khi bôi trên da mặc dù chưa có nghiên cứu hoặc quan sát thấy rõ ràng.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác thuốc: Không có tương tác thuốc cho đến nay.

Nhà sản xuất: Besins Manufacturing Belgium SA
Groot-Bijgaardenstraat 128, 1620 Drogenbos - Belgium



NHÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ

Lô A số 04 Trường Sơn, P.15, Q.10, TP. HCM - ĐT: 08 39703 695 - Fax: 08 39703 854

E-mail: vihepharmaco@hcm.vnn.vn