

BECOFORT®

125mg B1 - 125mg B6 - 250mcg B12

- ❖ Điều trị sự **thiếu hụt các Vitamin B1, B6, B12** do ăn uống không đầy đủ
- ❖ Liều cao điều trị **đau nhức do thần kinh, yếu cơ, rối loạn do nghiện rượu**



Nguyen
22/10/2013



SDK: VD-14236-11

SDK: VD-14235-11

BECOFORT

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa: Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) 125 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 125 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 250 mcg. **Trình bày:** Ví 15 viên nang mềm, hộp 6 ví. Ví 10 viên nén bao phim, hộp 10 ví. **Chỉ định:** Phòng & điều trị sự thiếu hụt các sinh tố nhóm B do chế độ ăn uống không đầy đủ. Với liều cao dùng để điều trị các chứng đau nhức do các bệnh lý thần kinh, bệnh yếu cơ, các rối loạn do nghiện rượu lâu năm. **Liều lượng và cách dùng:** Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: uống 1 viên mỗi ngày. Trường hợp đau dây thần kinh: 2 viên x 2 lần mỗi ngày. Không dùng thuốc liên tục quá 30 ngày. Nên nuốt trọn viên thuốc, không nghiền nát hoặc nhai trước khi nuốt. **Tác dụng phụ:** Vitamin B6: Dùng liều > 200mg/ ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng. Tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng. Tác dụng phụ chung, hiếm gặp: Toàn thân: phản vệ, sốt, ra nhiều mồ hôi, buồn nôn và nôn. Ngoài da: phản ứng dạng trứng cá, mề đay, ngứa, đỏ da. **Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh lý u ác tính: Do vitamin B12 làm tăng trưởng các mô có tốc độ sinh trưởng cao, nên có nguy cơ làm u tiến triển. Thận trọng: Dùng liều 200mg pyridoxine mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc pyridoxine. Nên hỏi ý kiến Bác sĩ nếu dùng cho trẻ em < 12 tuổi. Không dùng quá liều chỉ định. Phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. **Tương tác thuốc:** Isoniazide làm tăng tác dụng đối kháng với vitamin B6 bằng cách ức chế sự tạo thành dạng coenzyme của nó. Cycloserine và Hydralazine cũng là những chất đối kháng với vitamin B6. Việc dùng vitamin B6 làm giảm những ảnh hưởng lên thần kinh của các thuốc này. Vitamin B6 làm tăng tác dụng khử Carbon ngoại biên của Levodopa và do đó làm giảm hiệu quả của thuốc trong điều trị bệnh Parkinson. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **Nhà sản xuất:** CTY CPDP AMPHACO U.S.A. KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tel: 0613 566205; Fax: 0613 566203. **Nhà phân phối:** CTY CP Y DP Việt Nam - 126A Trần Quốc Thảo, Q. 3, Tp. HCM; CTY CPDP Thiết bị Y tế Hà Nội - 02 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. **Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:** Công ty sanofi-aventis - 10 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM, Điện thoại: (84 8) 3829 8526, Fax: (84 8) 3914 4801. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD: .../.../QLD-TT, ngày .../.../... In tài liệu .../.../...VN.VIT.13.04.01

SANOFI